

الفصل الثامن/البديهية الخامسة لافليدس

ان البديهية الخامسة لافليدس كانت هدفا لنقد علماء الرياضيات , فقد برهن افليدس مبرهناته ال ٢٨ بدون ان يستخدم البديهية الخامسة وقد استند اليها لأول مرة في برهان مبرهنة ٢٩ مما اثار انتباه العلماء حيث اعتقد البعض منهم بانها مبرهنة وبهذا يجب ان تبرهن وقد كانت هناك محاولات عديدة لبرهنتها وعلى فترة تزيد عن الف عام ولكن بائت كل المحاولات بالفشل لان البراهين كانت تعتمد على عبارات تكافئ البديهية الخامسة.

وتنص البديهية الخامسة على مايلي:

اذا قطع مستقيمان بمستقيم ثالث وكان مجموع الزاويتين الداخليتين الواقعتين على جهة واحدة من القاطع اقل من قائمتين , فان المستقيمين يتلاقيان في تلك الجهة من القاطع اذا مدا بغير حد.

بعض مكافئات البديهية الخامسة:

- ١- بديهية بليفيير : من نقطة لاتقع على مستقيم معلوم يمكن رسم موازي واحد فقط للمستقيم المعلوم.
- ٢- اذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين , فان الزاويتين الداخليتين المتبادلتين متساويتان والزاوية الخارجية تساوي الزاوية الداخلية المقابلة لها , ومجموع الزاويتين الداخليتين الواقعتين في نفس الجهة من القاطع يساوي زاويتين قائمتين . (مبرهنة ٢٩)
- ٣- مجموع زوايا المثلث يساوي زاويتين قائمتين .
- ٤- الزاوية الخارجية في المثلث تساوي مجموع الزاويتين الداخليتين المقابلتين لها.
- ٥- يوجد زوج من المثلثات المتشابه.
- ٦- اذا قطع مستقيم احد مستقيمين متوازيين فانه يقطع الاخر.
- ٧- المسافة العمودية بين مستقيمين متوازيين تكون ثابتة.
- ٨- يوجد زوج من المستقيمات التي تكون المسافة بينهما ثابتة.
- ٩- اذا كان مجموع زوايا أي مثلث مقدارا ثابتا, فان هذا المجموع يساوي زاويتين قائمتين.
- ١٠- اذا كانت ثلاث زوايا من شكل رباعي قوائم فالزاوية الرابعة تكون قائمة ايضا.
- ١١- المستقيمان الموازيان لمستقيم معلوم يكونان متوازيين.
- ١٢- لاي ثلاث نقاط لاتقع على مستقيم واحد, توجد دائرة تمر من هذه النقاط.

تعتبر البديهية الخامسة لافليدس والمسماة " بديهية التوازي " نقطة بداية لدراسة الهندسة اللاقليدية.

ويمكن تحديد مواقف هؤلاء المعترضين باحد المواقف التالية:

- ١- اعتقد بعضهم بان بديهية التوازي يجب ان تكون نظرية ولذلك تحتاج الى برهان يعتمد على المفاهيم الاساسية والبديهيات الاربعة الاولى .
- ٢- وقال اخرون يمكن برهان نظرية ٢٩ لافليدس بدون استخدام بديهية التوازي فلا حاجة لوضع هذه البديهية . بطليموس اعتمد على هذه النظرية.

٣- وآخرون فرضوا نقيض بديهية التوازي واستمروا في اشتقاق النظريات لعلمهم يحصلون على تناقض وبذلك يثبتون صحتها.

محاولات لبرهنة البديهية الخامسة أو إحدى مكافئاتها:

إن أول محاولة لبرهان بديهية التوازي لاقليدس كانت من قبل العالم الفلكي بطليموس الذي عاش في القرن ٢ في مدينة الإسكندرية حيث حاول بطليموس:

- ١- برهان نظرية ٢٩ بدون استخدام بديهية التوازي .
- ٢- برهان بديهية التوازي.

مبرهنة ٢٩: إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين , فإن الزاويتين الداخليتين المتبادلتين متساويتان والزاوية الخارجية تساوي الزاوية الداخلية المقابلة لها , ومجموع الزاويتين الداخليتين الواقعتين في نفس الجهة من القاطع يساوي زاويتين قائمتين.

المفروض / المستقيم AB يوازي المستقيم المستقيم CD .

$$\text{م. ث: } \begin{aligned} \angle 1 &= \angle 2 \\ \angle 3 &= \angle 4 \end{aligned} \text{ بالتبادل.}$$

$$\begin{aligned} \angle 5 &= \angle 2 \\ \angle 6 &= \angle 4 \end{aligned} \text{ بالتناظر.}$$

$$\angle 3 + \angle 2 = 180$$

$$\angle 1 + \angle 4 = 180$$

البرهان:

لقد افترض بطليموس مايلي: إن امتداد المتوازيين في جهة واحدة من القاطع لا يختلف عن امتدادهما من الجهة الأخرى.

إذا كان $\angle 2 + \angle 3 < 180$, فإن

$$\angle 1 + \angle 4 < 180 ,$$

اذن $\angle 2 + \angle 3 + \angle 1 + \angle 4 < 360$ (لا يمكن : لأن مجموع الزوايا الأربعة يساوي أربع زوايا قوائم).

وبنفس الطريقة إذا كان :

$$\angle 2 + \angle 3 > 180 , \text{ فإن}$$

$$, \angle 1 + \angle 4 > 180$$

اذن $\angle 2 + \angle 3 + \angle 1 + \angle 4 > 360$, وهذا لا يمكن لنفس السبب السابق.

اذن يجب ان يكون مجموع الزوايا يساوي 180 .

بما ان $\angle 2 + \angle 3 = 180$ بالبرهان.

وان $\angle 1 + \angle 3 = 180$ (زاوية مستقيمة)

اذن $\angle 2 + \angle 3 = \angle 1 + \angle 3$ وبطرح $\angle 3$ من الطرفين نحصل على $\angle 2 = \angle 1$.

وبنفس الطريقة نبرهن ان $\angle 3 = \angle 4$.

وبما ان $\angle 2 + \angle 3 = 180$ بالبرهان,

ولكن $\angle 5 + \angle 3 = 180$ (زاوية مستقيمة).

اذن $\angle 3 + \angle 2 = \angle 3 + \angle 5$ وبالطرح نحصل , $\angle 2 = \angle 5$.

وبنفس الطريقة نبرهن ان $\angle 6 = \angle 4$.

الانتقاد: ان فرضية بطليموس التي اعتمدها لبرهان النظرية اعلاه هي تفسير اخر لبديهية بليفير.
فهو افترضها من حيث لا يعلم لذا فهو افترض مايجب برهانه.

الفصل الثامن // البديهية الخامسة لافليدس

البديهية الخامسة لافليدس: اذا قطع مستقيمان بمستقيم ثالث وكان مجموع الزاويتين الداخليتين الواقعتين على جهة واحدة من القاطع اقل من قائمتين , فان المستقيمين يتلاقيان في تلك الجهة من القاطع اذا مدا بغير حد.

البرهان:

المفروض / ليكن AB, CD مستقيمان.

والمستقيم EF يقطعهما في X, Y على التوالي .

بحيث ان $\angle 1 + \angle 2 < 180$.

م. ث: المستقيمان AB, CD يلتقيان في جهة القاطع الحاوية B, D .

البرهان:

ان لم يكن AB, CD متلاقين فانهما متوازيان.

وحسب Th29 : $\angle 1 + \angle 2 = 180$ وهذا خلاف الفرض. (لان $\angle 1 + \angle 2 < 180$)

اذن المستقيمين AB, CD يجب ان يتلاقيان .

ولو كان المستقيمان AB, CD متلاقين في جهة A, C لاصح لدينا مثلث فيه الزاويتين مجموعهما اكبر من 180 . (يناقض نظرية افليدس).

اذن المستقيمان AB, CD يتلاقيان من جهة B, D .

محاولة بروكلس لبرهنة بديهية افليدس الخامسة:

البرهان: افترض بروكلس لبرهان بديهية التوازي الفرضية التالية

" المستقيم الذي يقطع احد مستقيمين متوازيين فانه يقطع الاخر".

المفروض / AB, CD مستقيمين وقد قطعهما القاطع AC , وكانت الزاويتان الداخليتان $\alpha + \beta < 180$.

م. ث: AB, CD يتلاقيان من جهة B, D .

البرهان:

نرسم AE بحيث ان

$$\angle CAE + \angle \beta = 180$$

من Th28 لافليدس والتي تنص " اذا قطع مستقيم مستقيمين وكانت الزاوية الخارجية تساوي الزاوية الداخلية والمقابلة لها في نفس الجهة من القاطع, او كان مجموع الزاويتين الداخليتين الواقعتين على جهة واحدة من القاطع يساوي قائمتين , يكون المستقيمان متوازيين."

نحصل : AE يوازي CD .

ولكن $\alpha + \beta < 180$ من الفرض.

وبذلك تكون $\angle CAE$ اكبر من $\angle \alpha$.

أي ان AE لاينطبق على AB .

لذا فان AB يقطع احد المتوازيين AE , فيجب ان يقطع الموازي الاخر CD , وبذلك يتلاقى AB, CD .

ولو كان المستقيمين CD , AB يتلاقيان في جهة A,C , لاصبح لدينا مثلث فيه زاويتين اكبر من 180 وهذا تناقض مع Th17 "مجموع زاويتان في مثلث كيفما اتخذت اقل من زاويتين قائمتين". اقليدس .

اذن يجب ان يتلاقيان من جهة B,D .

محاولة عمر الخيام : حاول أن يبرهن " إذا احتوى الشكل الرباعي على ثلاثة زوايا قوائم فان الزاوية الرابعة تكون قائمة أيضا".

رباعي الخيام: فرض ان AB قطعة مستقيم وان AC, BD عمودان على AB ثم رسم قطعة مستقيم بين C,D .

فتكون شكل رباعي ABCD وفيه.

$$1 - \angle A = \angle B = 90 . \text{ زوايا متجاورة وقائمة}$$

$$2 - A-C=B-D .$$

يسمى هذا الشكل برباعي الخيام.

ويسمى الضلع A-B القاعدة (الضلع الذي يصل الزاويتين A,B) ويسمى الضلع C-D السميت (وهو الضلع المقابل للقاعدة) . ويسمى AC, BD بالساقين وتسمى الزاويتان $\angle C, \angle D$ بزوايتي السميت .

برهان عمر الخيام:

اولا: برهن عمر الخيام ان زاويتي السميت في رباعي الخيام متساويتين .

ثانيا: برهن عمر الخيام ان المستقيم الواصل بين منتصف القاعدة والسميت في رباعي الخيام يكون عموديا عليها.

الخطأ في برهان عمر الخيام:

اعتمد على بديهيات تكافئ بديهية التوازي وهي:

- ١- اذا احتوى الشكل الرباعي على ثلاث زوايا قوائم فان الزاوية الرابعة قائمة.
- ٢- المسافة العمودية بين مستقيمين متوازيين تكون ثابتة.

محاولة جون والاس:

فرض جون والاس انه بالامكان رسم مثلث مهما يكن قياسه يشابه مثلثا معلوما .ولكن هذه العملية من مكافئات البديهية الخامسة لافليدس.

محاولة ساكيري :

حيث حاول اثبات ان مجموع زوايا المثلث يساوي زاويتين قائمتين وذلك ببرهنة ان مجموع زوايا السميت لرباعي الخيام يساوي قائمتين.

لقد كان برهانه طويل ومعقد وغير واضح وقد اعطى بعض الحقائق الصحيحة منها:

- ١- اذا كان مجموع زاويتي السميت في شكل رباعي الخيام واحد قائمتين , فان أي شكل رباعي اخر مثل هذا يكون مجموع زاويتي السميت له قائمتان ايضا.
- ٢- اذا كان مجموع زاويتي السميت في شكل رباعي الخيام اقل او اكثر من قائمتين او يساوي قائمتين , فان مجموع زوايا المثلث يكون اقل او اكثر او يساوي لزاويتين قائمتين.
- ٣- اذا وجد مثلث واحد مجموع زواياه يساوي قائمتين او اقل او اكثر من قائمتين , فان مجموع زاويتي السميت في رباعي الخيام يساوي قائمتين او اقل او اكثر من قائمتين على التوالي.
- ٤- كل مستقيمين في المستوي اما ان يكون لهما عمود مشترك او يتقاطعان (اذا مدا) او يتقاربان باستمرار.

محاولة ليجندر:

حاول ليجندر اثبات بديهية اقليدس الخامسة وذلك بان برهن مكافئتها " مجموع زوايا المثلث يساوي قائمتين " , افترض العكس بالبرهان وكان هناك احتمالين:

اولا: اذا كان مجموع زوايا المثلث اكثر من قائمتين. ولكن هذا يخالف نظرية ١٧ لاقليدس. والخلل في هذا البرهان هو مد قطعة المستقيم الى مالانهاية وهذا غير صحيح.

ثانيا : اذا كان مجموع زوايا المثلث اصغر من قائمتين.

وهذا الاحتمال يؤدي الى ان مجموع زوايا المثلث يساوي $180^\circ - 2\alpha$ سالبا , وهذا غير ممكن لان مجموع زوايا المثلث موجب.

الفصل التاسع

" Hyperbolic Geometry " الهندسة الهذلولية

بعد المحاولات التي بذلت من قبل العلماء في برهان بديهية التوازي الخامسة لافليدس بدأوا يشكون في امكانية برهان هذه البديهية ونتيجة لهذه المحاولات فقد ولدت الهندسة اللاقليدية وعندما اثبت عدم امكان اشتقاق بديهية التوازي من فرضيات افليدس فقد بنيت الهندسة اللاقليدية على فرضيات افليدس عدا بديهية التوازي . ولقد برهن العلماء .لقد تمكن العالمان جون بوليا الهنغاري ولوباجفسكي الروسي بان البديهية الخامسة مستقلة عن البديهيات الاربعة الاولى حيث تم تبديل البديهية الخامسة لافليدس وحل محلها نقيضها في الحالة :

وجود اكثر من مواز واحد لمستقيم من نقطة خارجة عنه , تدعى هذه الهندسة بالهندسة الهذلولية.

البديهية المميزة للهندسة الهذلولية:

بديهية التوازي الهذلولية HPP :

AX17 : اذا كانت P نقطة لاتقع على مستقيم معلوم m , فانه يوجد شعاعان فقط , وليكن \vec{PR} و \vec{PS} , بحيث ان :

١- \vec{PR} و \vec{PS} شعاعين غير متعاكسين.

٢- \vec{PR} و \vec{PS} لا يقطعان m .

٣- أي شعاع \vec{PQ} يقطع m اذا فقط اذا \vec{PQ} يقع بين \vec{PR} و \vec{PS} .

تعريف : كل من الشعاعين \vec{PR} و \vec{PS} المذكورين في HPP , يدعى موازي الى m من P .

مبرهنة ١٠٢ :

اذا كان شعاع يقع بين شعاع موازي لمستقيم معلوم وشعاع يقطع المستقيم المعلوم فان الشعاع يقطع المستقيم المعلوم.

البرهان:

ليكن \vec{PR} و \vec{PS} شعاعين يوازيان خط m من نقطة P .

و B اية نقطة تقع على m و \vec{PQ} أي شعاع يقع بين \vec{PR} و \vec{PB} .

يجب ان نبرهن ان \vec{PQ} يقطع m .

بما ان \vec{PB} يقطع m , فانه من HPP , \vec{PB} يقع بين \vec{PR} و \vec{PS} . وبما ان \vec{PQ} يقع بين \vec{PR} و

\vec{PB} فانه من Th47, 1 : \vec{PQ} يقع بين \vec{PR} و \vec{PS} , ومن HPP , \vec{PQ} يقطع m .

وبنفس الطريقة اذا فرضنا ان \vec{PQ} يقع بين \vec{PS} و \vec{PB} فانه \vec{PQ} يقطع m .

ملاحظة : من الواضح انه توجد مستقيمت عديدة لاتقطع المستقيم والتي هي ليست موازيات للمستقيم .

المبرهنة التالية تبين على ان الموازي هو اول المستقيمت التي لاتقطع.

مبرهنة ١٠٣ : اذا كان \vec{PQ} لايقطع مستقيم m , لكن أي شعاع يقع بين \vec{PQ} و \vec{PB} , حيث ان

B نقطة على m , يقطع m , فان \vec{PQ} يوازي المستقيم m .

البرهان:

ليكن m مستقيما , P نقطة لاتقع على m , و \vec{PQ} شعاع لايقطع m .

من HPP : يوجد شعاعان \vec{PR} و \vec{PS} من P ويوازيان m . لتكن B اية نقطة على m .

من الفرض : P, B, Q لاتقع على مستقيم واحد.

Q لاتقع على المستقيم PB .

تقع Q في احدى جهتي PB .

من HPP : \vec{PR} و \vec{PS} في الجهتين المتعاكستين للمستقيم PB .

وعليه يوجد احتمالين:

١- اما تقع Q في جهة \vec{PB} التي تحتوي R .

٢- او تقع في جهة \vec{PB} التي تحتوي S .

الاحتمال الاول: عندما تقع Q في جهة \vec{PB} التي تحتوي R .

وهذا يؤدي الى ثلاث احتمالات :

أ- اما \vec{PR} يقع بين \vec{PB} و \vec{PQ} .

ب- او \vec{PQ} يقع بين \vec{PB} و \vec{PR} .

ت- او $\vec{PR} = \vec{PQ}$.

في حالة أ : \vec{PR} يقع بين \vec{PB} و \vec{PQ} .

فمن الفرض : \vec{PR} يقطع m وهذا يخالف Ax17 .

في حالة ب : \vec{PQ} يقع بين \vec{PB} و \vec{PR} .

حسب Th102 : \vec{PQ} يقطع m وهذا يخالف الفرض.

وعليه الحالة الوحيدة المقبولة عندما $\vec{PR} = \vec{PQ}$.

وبنفس الطريقة اذا كانت Q تقع في جهة \vec{PB} التي تحتوي S .

مبرهنة ١٠٤ :

اذا كانت نقطة Q هي اثر العمود النازل من نقطة معلومة P لمستقيم m , و \vec{PR} و \vec{PS} الموازيان من P الى المستقيم m , فان $\angle RPQ \cong \angle SPQ$.

البرهان : H.W

مبرهنة ١٠٥ :

اذا كان \vec{PS} و \vec{PR} هما الشعاعين الموازيين من نقطة P لمستقيم معلوم m , فان المنصف للزاوية $\angle RPS$ يكون عموديا على المستقيم m .

البرهان:

حسب Th41 : \vec{PA} يقع داخل الزاوية .

وحسب التعريف : \vec{PA} يقع بين \vec{PR} و \vec{PS} .

وحسب Ax17 " HPP " : \vec{PA} يقطع m في نقطة ولتكن Q .

لو افترضنا ان \vec{PQ} لا يكون عمودي على m .

وحسب Th89 : اقامة عمود على خط من نقطة خارجة عنه , يوجد \vec{PQ}' عمود على m .

وحسب Th104 : $\angle RPQ' \cong \angle SPQ'$

\vec{PQ}' هو منصف اخر للزاوية $\angle RPS$ وهذا يناقض Th 82 " منصف الزاوية وحيد" .

نستنتج من هذا ان الشعاع \vec{PA} هو المنصف للزاوية ويكون عمودي على الخط m .

مبرهنة ١٠٦ :

اذا كانت نقطة Q هي اثر العمود النازل من نقطة P على مستقيم معلوم m , و \vec{PR} و \vec{PS} هما الشعاعان الموازيان للمستقيم m من P , فان $\angle RPQ$ و $\angle SPQ$ زاويتان حادتان .

البرهان:

يجب ان نبرهن ان :

$\angle 1, \angle 2$ اقل من 90 (زاوية حادة) .

حسب Th62 : يتحقق واحد فقط مما يلي

١- $\angle 1, \angle 2$ قوائم .

٢- $\angle 1, \angle 2$ منفرجة .

٣- $\angle 1, \angle 2$ حادة .

الاحتمال الأول: عندما $\angle 1, \angle 2$ قوائم .

وحسب Ax ? : جميع الزوايا القوائم متساوية.

إذن $\angle 1 = \angle 2$ ← $\angle 1 \cong \angle 2$.

اذن الزاويتان $\angle 1, \angle 2$ متكاملتان ومتجاورتان.

وحسب نتيجة ٣ و نظرية ٥٨ : $\angle 1, \angle 2$ يكونان زوج خطي.

اذن \vec{PR} و \vec{PS} متعاكسين وهذا تناقض مع Ax17 .

الاحتمال الاول مرفوض.

الاحتمال الثاني: عندما $\angle 1, \angle 2$ منفرجة.

الان $\angle 2 > 90$

وحسب تعريف العلاقة < : يوجد شعاع \vec{PE} داخل $\angle 2$ بحيث ان $\angle 3$ قائمة.

$\angle 3, \angle 4$ قوائم .

اذن مجموعهما 180 .

حسب Th74 : نحصل على PE يوازي m ١

ولكن الشعاع \vec{PE} يقع بين القاطع PQ والموازي PR (لانه داخل $\angle 2$).

وحسب Th102 : الشعاع \vec{PE} يقطع الخط m .

ولكن الشعاع جزء من الخط.

اذن الخط PE يقطع الخط m..... ٢

من ١ و ٢ نحصل على تناقض.

اذن الاحتمال الثاني مرفوض.

اذن الاحتمال الوحيد المقبول هو ان $\angle 1, \angle 2$ حادثان.

مبرهنة ١٠٧:

اذا كان الشعاع \vec{PS} موازيا الى مستقيم m من نقطة P , و X هي نقطة على الخط PS بحيث ان X-P-S

١- من الخطأ ان يكون \vec{PX} موازيا الى m .

٢- من الخطأ ان يكون \vec{PX} قاطعا الى m .

٣- المستقيم PS لا يقطع m .

٤-

تعريف / ليكن \vec{PR} و \vec{QS} شعاعين لا يقعان على مستقيم واحد , وان P و Q نقطتان مختلفتان , يقال ان \vec{PR} و \vec{QS} في نفس الاتجاه اذا فقط اذا كانا في نفس الجهة من الخط PQ .

تعريف/ اذا كان \vec{PS} شعاعا يوازي خط m من نقطة P , واذا كان \vec{QX} أي شعاع على m , في نفس اتجاه \vec{PS} , فانه يقال ان \vec{PS} يوازي \vec{QX} .

مبرهنة ١٠٨:

ليكن m مستقيما و P نقطة لاتقع على m , شعاعا يوازي m من P اذا كانت A أي نقطة على المستقيم الذي يحتوي \vec{PR} , أي ان اذا كان اما P-A-R او A-P-R , فان \vec{AR} يوازي m .

مبرهنة ١٠٩:

اذا كان \vec{AR} يوازي \vec{BS} فان \vec{BS} و \vec{AR} يوازي .

مبرهنة ١١٠:

إذا كان شعاعان في نفس الاتجاه ويوازيان شعاعا ثالثا , فان احدهما يوازي الاخر.
مبرهنة ١١١ :

الزاويتان المتناظرتان المتكونتان من موازيين واي قاطع غير متطابقتين .
البرهان:

ليكن \vec{XR} يوازي \vec{YS} وان الخط AB يقطع الشعاع \vec{XR} في A والشعاع \vec{YS} في B .
 $A \neq B$ (ذلك لان الشعاعين غير متقاطعين) .

وحسب Ax9 : توجد نقطة C بحيث $B-A-C$.
الزاويتان $\angle CBS, \angle CAR$ متناظرتان .

وللسهولة $\angle 1, \angle 2$ متناظرتان .

يجب ان نبرهن ان $\angle 1$ لا تطابق $\angle 2$.

من Th108 + التعريف : \vec{AR} يوازي \vec{BS} .

نفرض ان $\angle 1 \cong \angle 2$.

وان $\angle 1 = 90$ فانه $\angle 2 = 90$.

وبالتالي نحصل ان $\angle 3$ قائمة ايضا .

وعليه فان $\angle 2 \cong \angle 3$ (تناقض مع Th106 , لانه يجب ان تكون احدهما حادة عندما يكون
احدهما قائمة) .

ناخذ النقطة M منتصف القطعة $A-B$,

ومن نقطة M نرسم عمود على الخط AR .

واضح ان $E \neq A$ (لان $\angle 3$ ليست قائمة) .

وان النقطة E توجد في احدى جهات الخط AB (حسب Th28) .

وناخذ نقطة D على الشعاع \vec{BS} وانها تقع في جهة الخط AB التي لا تحتوي E بحيث ان
 $E - A \cong B - D$ (حسب Ax11) .

وحسب Ax1 : نصل الخط MD , والان نطابق $\triangle AME, \triangle BMD$ وفيهما

$\angle 8 = 90$ بالعمل (لان $ME \perp AR$) .

وان $\angle 2 = 90$ (بالافتراض).

وان $A - M \cong M - B$ (M نقطة منتصف).

حسب Th56 : يتطابق المثلثان ومن التطابق ينتج

$\angle 4 \cong \angle 5$, وحسب Ax15 : $\angle 6 \cong \angle 6$.

بما ان $\angle 5, \angle 6$ تكونان زوج خطي.

وحسب تعريف الزوايا المتكاملة : $\angle 4, \angle 6$ تكونان متكاملتان لانهما يكافؤان زوجا خطي.

بما ان $\angle 4, \angle 6$ متكاملتان وتجاورتان , حسب Th58 نتيجة $\angle 4, \angle 6$: تكونان زوجا خطيا.

اذن الشعاعين \vec{ME} و \vec{MD} متعاكسين.

وكذلك نحصل $\angle 7 \cong \angle 8$.

ولكن $\angle 8$ قائمة.

اذن $\angle 7$ قائمة وان $\angle 9$ قائمة ايضا.

الان اصبح لدينا الشعاع \vec{ED} عمود على الشعاعين المتوازيين \vec{ER} و \vec{DS} , بحيث ان $\angle 8, \angle 9$ قوائم.

وهذا تناقض مع Th106 : اذن $\angle 1$ لا تطابق $\angle 2$.

نتيجة : الزاويتان الداخليتان المتبادلتان المتكونتان من مستقيمين متوازيين واي قاطع غير متطابقتين.

البرهان:

حسب Th111 : $\angle 1$ لا تطابق $\angle 3$

حسب Th58 نتيجة ٢ : $\angle 2 \cong \angle 3$

اذن $\angle 1$ لا تطابق $\angle 2$.

المثلث المحاذي (مثلث ذو راسين)

عندما يقطع مستقيمين متوازيين بقاطع , فان الشكل الناتج يدعى مثلث محاذي او مثلث ذو
راسين Two – vertices- triangle ويرمز له T-V-T , سنتناول خواصه كما يلي:

ليكن الشعاعين \vec{XR} يوازي \vec{YS} وقد قطعهما قاطع في النقطتين A,B على الترتيب بحيث كان:

$$X-A-R \quad -1$$

$$Y-B-S \quad -2$$

اولا : ان المثلث المحاذي RABS يعرف بانه:

$$\Delta RABS = \vec{AR} \cup \vec{BS} \cup (A-B) \cup \{A, B\}$$

A-B تدعى ضلع المثلث المحاذي A,B تدعيان الراس.

ثانيا: الزاويتين $\angle ABS, \angle BAR$, او بعبارة اخرى $\angle 1, \angle 2$ يسميان زوايا المثلث المحاذي , وكذلك تدعيان الزاويتين الداخليتين.

ثالثا: الزوايا $\angle XAB, \angle YBA$, او بعبارة اخرى $\angle 3, \angle 4$ وزاويتاهما الراسيتان زوايا خارجية للمثلث المحاذي.

رابعا: لو اخذنا زوج من الزوايا احدهما داخلية والاخرى خارجية لمثلث محاذي وغير متجاورتين , فانهما يسميان داخلية مقابلة وخارجية مقابلة نسبة واحدة للاخرى مثل $\angle 4, \angle 1$ $\angle 3, \angle 2$

خامسا: يعرف داخل المثلث المحاذي هو عبارة عن تقاطع المجموعات التالية

$$(\text{جهة الخط } AB \text{ الحاوية } R) \cap (\text{جهة } BS \text{ الحاوية } A) \cap (\text{جهة } AR \text{ الحاوية } B) = (\text{داخل المثلث } RABS)$$

سادسا: يعرف خارج المثلث المحاذي كما يلي

$$(\text{داخل المثلث المحاذي}) - X = \text{خارج المثلث المحاذي}$$

حيث تمثل X : المستوي الكلي.

او بعبارة اخرى: مجموعة كل النقاط التي لاتقع على المثلث ولا تقع في داخله.

مبرهنة ١١٢:

لتكن P نقطة في داخل مثلث محاذي RABS فان:

- ١- الخط الذي يمر من P واي راس من المثلث يقطع الشعاع الاخر.
 - ٢- الخط الذي يمر من P ويوازي أي من الشعاعين يقطع الضلع.
- البرهان:

- ١- بما ان P تقع في داخل المثلث المحاذي اذن P تقع داخل $\angle 1$.

وحسب Th41 : \vec{AP} يقع داخل $\angle 1$.

حسب تعريف شعاع بين شعاعين: الشعاع \vec{AP} يقع بين \vec{AR} , \vec{AB} وان احدهما موازي والاخر قاطع.

وحسب Th102 : الشعاع \vec{AB} يقطع الخط BS في نقطة ولتكن C.....١
واضح ان $C \neq B$ (لان C تقع داخل $\angle 1$ و B على الزاوية).

الشعاع \vec{AC} يقع داخل $\angle 1$.

وبالتالي فان النقطة C تقع داخل $\angle 1$.

اذن النقطة C تقع في جهة AB الحاوية C .

اذن C تقع في جهة الخط AB الحاوية S٢

من ١,٢ و Th28 , ٦ : $C \in \vec{BS}$.

اذن اصبح لدينا الخط AC وهو نفسه AP يقطع شعاعي $\angle 2$.

اذن الشعاع \vec{AP} يقطع \vec{BS} في C .

وبنفس الطريقة نبرهن ان \vec{BP} سيقطع الشعاع \vec{AR} .

H.W -٢

مبرهنة ١١٣:

اذا كان مستقيم لا يمر باي راس من مثلث محاذي وانه:

- ١- يقطع احد الشعاعين , فانه يقطع الشعاع الاخر او الضلع .
 - ٢- يقطع الضلع ولا يوازي أي شعاع , فانه يقطع شعاعا واحدا فقط من الشعاعين.
- البرهان:

١- ؟

٢- نفرض m يقطع AB في نقطة ولتكن C .

وان m لا يوازي أي شعاع (أي \vec{AR} , \vec{BS}).

وحسب Ax17 (H.P.P) : من نقطة C نرسم الشعاع \vec{CT} ويوازي \vec{AR} .

وحسب Th110 : \vec{CT} يوازي \vec{BS} .

وبذلك حصلنا على مثلثين محاذيين $TCBS$, $RACT$.

اذن توجد نقطة $X \in m$, بحيث ان X تقع داخل $\angle 1$, او داخل $\angle 2$ ؟

وحسب Th112 , ١ : الخط m سيقطع الشعاع \vec{AR} .

او الخط m سيقطع الشعاع \vec{BS} وليس كلاهما.

مبرهنة ١١٤ :

الزاوية الداخلية لمثلث محاذي تكون اصغر من الزاوية الخارجية المقابلة لها.

مبرهنة ١١٥ :

اذا كانت زاوية في مثلث محاذي تطابق زاوية في مثلث محاذي اخر , والضلعين متطابقين , فان الزاويتين الباقيتين متطابقتان.

البرهان:

لتكن $RABS$, $R'A'B'S'$ مثلثين محاذين فيهما :

$$A - B \cong A' - B'$$

$$\angle B \cong \angle B'$$

يجب ان نبرهن ان: $\angle A \cong \angle A'$

الان نناقش الزاويتان اعلاه:

حسب Th62 : يتحقق واحد فقط مما يلي

$$\angle A < \angle A'$$

$$\angle A' < \angle A$$

$$\angle A \cong \angle A'$$

الاحتمال الاول : عندما $\angle A' < \angle A$

وحسب تعريف العلاقة اصغر من : يوجد شعاع \vec{AC} داخل $\angle A$ بحيث ان $\angle 1 \cong \angle 2$

وحسب Th102 : \vec{AC} يقطع \vec{BS} في نقطة ولتكن D .

وحسب Ax11 : نختار النقطة D' على الشعاع $\vec{B'S'}$ بحيث ان $B - D \cong B' - D'$

وحسب Ax1 : نصل 'A'D' .

نناقش $\Delta ADB, A'D'B'$ وفيهما:

$\angle 3 \cong \angle 4$ بالفرض , $B - D \cong B' - D'$ بالعمل

$A - B \cong A' - B'$.

وحسب Th SAS : يتطابق المثلثين ومن التطابق ينتج $\angle 1 \cong \angle 5$

ولكن $\angle 1 \cong \angle 2$

حسب Ax15 : $\angle 2 \cong \angle 5$

وحسب Ax14 : $A'D' = A'R'$ وهذا تناقض لان $A'R'$ يوازي $B'S'$ و $A'D'$ يقطع $B'S'$.

اذن الاحتمال الاول مرفوض.

وبنفس الطريقة نبرهن ان $\angle A < \angle A'$ احتمال مرفوض ايضا.

الاحتمال الوحيد المقبول هو $\angle A \cong \angle A'$.

مبرهنة ١١٦ : اذا كانت الزاويتان في مثلث محاذي تطابقان , على التوالي الزاويتين في مثلث محاذي اخر , فان الضلعين متطابقان.

البرهان: H.W

ملاحظة: في الهندسة الهذلولية يكون مجموع زوايا المثلث اقل من 180 .

تعريف الانحراف المثلثي: ليكن ABC مثلث فان الانحراف المثلثي يعرف كما يلي:

$$\text{Defect} (\Delta ABC) = 180 - (\angle A + \angle B + \angle C)$$

مثال / اوجد الانحراف المثلثي لمثلث ABC مجموع زواياه 150 .

ج/ 30 .

الفصل العاشر : الهندسة الاهليجية او (الناقصية , البيضوية)

Elliptic Geometry

ان اول من اشار الى هذه الهندسة هو العالم الالماني ريمان في عام ١٨٥٤ في رسالة الدكتوراه حيث اخذ نقيض بديهية بليفر " وهي احدى مكافئات البديهية الخامسة لاقليدس " وكما يلي :

البديهية المميزة للهندسة الاهليجية:

" لايمكن رسم أي مواز لخط معلوم من نقطة خارجة عنه".

وفي هذه الهندسة ميز ريمان بين فكرة المستقيم الغير منتهي وفكرة المستقيم الغير محدود . (حيث سابقا لا يوجد فرق) وبذلك اخذ الخطوط اقواس لدوائر عظيمة على سطح كرة نصف قطرها الثابت a . فان الخط منتهي بالطول , حيث له محيط معلوم ولكن غير محدود في المفهوم الذي نستمر فيه حول الكرة دون توقف.

اذا الكرة هي نموذج لهذه الهندسة.

نقاط هذا النموذج هي نقاط على سطح الكرة.

وان المستقيمتان لهذا النموذج هي دوائر عظيمة. بما ان الدوائر العظمى تتقاطع دائما , فان المستقيمتين يتقاطعان دائما , ولذلك لا توجد مستقيمتان موازية للمستقيم. بما ان توجد عدد غير منته من دوائر عظيمة تمر بنقطتين متقابلتين بالقطر , فان النقطتين لاتعبران دائما مستقيمتين واحدا فقط. وبذلك فان بديهيات الوقوع غير متحققة. والتحول من الهندسة الاقليدية الى الهندسة الاهليجية لا يتم بسهولة كما يتم مع التحول من الهندسة الاقليدية الى الهندسة الهذلولية.

يوجد نوعان من الهندسة الاهليجية:

١- الهندسة الاهليجية الاحادية: (Single E.G) والتي يكون فيها أي مستقيمتين يتقاطعان في نقطة واحدة فقط. وان المستوى الاهليجي يتميز بان سطحه له جهة واحدة . وكمثال بسيط على ذلك ورقة موفيس, ونموذج اخر عليها هو نصف كرة فقط .

٢- الهندسة الاهليجية الثنائية: (Double E.G) والتي يكون فيها أي مستقيمتين يتقاطعان في نقطتين . وان المستوى الاهليجي يتميز بان سطحه له جهتين . مثلا الكرة التي فيها جهتين .

مبرهنة ١: أي مستقيمتين في الهندسة الاهليجية المزدوجة يتقاطعان في نقطتين ويحيطان منطقة لمساحة منتهية A حيث ان $A \neq 0$. او الخط المار بنقطتين متقابلتين ليس وحيد .

سنوضح عددا من المبرهنات المشتركة للهندسة الاحادية والمزدوجة .

مبرهنة ٢: العمودان على نفس المستقيم يتقاطعان في نقطة . مثلا تقاطع خطوط الطول والعرض على سطح الكرة الارضية.
نستنتج هذه المبرهنة من البديهية المميزة لهذه الهندسة , حيث ان الخطين في المستوي يتقاطعان دائما.

مبرهنة ٣: الاعمدة على كل النقاط لمستقيم تلتقي في نقطة تدعى قطب الخط, وبالعكس كل مستقيم يمر بالقطب يكون عموديا على المستقيم . مثل خطوط الطول هي نماذج للخطوط العمودية على خط الاستواء , وان كل هذه الخطوط تتقاطع في القطبين الشمالي والجنوبي . المسافة q من قطب مستقيم للمستقيم , هي المسافة القطبية للمستقيم.

مبرهنة ٤: في أي مثلث ABC , الذي فيه $\angle B = \angle C = 90$, تكون اصغر من تساوي او اكبر من 90 نسبة الى ان القطعة BC اصغر من , تساوي , او اكبر من المسافة القطبية q .

مبرهنة ٥: مجموع زوايا المثلث هو اكبر من 180 .
البرهان:

لتكن B, C نقطتين مختلفتين على مستقيم l . نرسم مستقيمين عمودين من l على B, C وهذان المستقيمان سيتقاطعان في نقطة A .
ولذلك فان مجموع زوايا المثلث اكبر من 180 .

جدول لمقارنة بين الهندسة الاقليدية واللاقليدية :

اهليجية	هذلولية	اقليدية	
نقطة واحدة (احادية) نقطتان (المزدوجة)	نقطة واحدة على الاكثر	نقطة واحدة في الاكثر	يتقاطع المستقيمان في
لا يوجد موازي الى l من P	يوجد موازيان للمستقيم l من P	يوجد موازي واحد وواحد فقط للمستقيم l من P	ليكن l مستقيما و P نقطة لاتقع على l فانه .
كلا	بواسطة نقطة	بواسطة نقطة	يفصل المستقيم الى نصفيين
—	قد يقطع ا و لا يقطع	يقطع الاخر	اذا قطع مستقيم احد مستقيمين متوازيين فانه
متقاطعان	غير متوازيين	متوازيين	العمودان على نفس المستقيم يكونان
اكثر من زاويتين قائمتين	اقل من زاويتين قائمتين	تساوي زاويتين قائمتين	مجموع زوايا المثلث

الفصل الحادي عشر

الهندسة الإسقاطية التركيبية:

نستذكر البديهيات الاربع الخاصة بالهندسة الإسقاطية التي تناولناها بالفصل الاول:

- 1- لاي نقطتين مختلفتين A و B في π , يوجد مستقيم واحد فقط يحتويهما.
- 2- كل مستقيم يحتوي على ثلاث نقاط في الاقل.
- 3- توجد في الاقل نقطة واحدة A ويوجد في الاقل مستقيم واحد l بحيث ان $A \notin l$.
- 4- أي مستقيمين مختلفين يشتركان في نقطة واحدة في الاقل.

مبرهنة 1: أي مستقيمين مختلفين l,m في π يتقاطعان بنقطة واحدة وواحدة فقط.

مبرهنة 2: اية نقطة في π يمر بها ثلاث مستقيمت في الاقل.

مبدأ الثنائية (Principle of duality)

تعريف: عبارتان تكون أحدهما ثنائية (dual) للأخرى إذا أمكن حصول واحدة من الأخرى بتبديل الكلمتين " النقطة" و " المستقيم" أحدهما محل الأخرى.

نتيجة لذلك تقع على — يمر به .

نصل خط بين نقطتان — يتقاطع الخطان.

نقاط على خط واحد — خطوط ملتقية بنقطة واحدة.

مثال : اوجد مثني العبارة التالية

يوجد على الأقل نقطة A خارجة من خط معلوم l .

المثني (dual): يوجد على الأقل خط l لا يمر من نقطة معلومة A .

ملاحظة// تدعى العبارة ثنائية نفسها (self dual) إذا حصلنا على نفس العبارة بتبديل الكلمتين " النقطة" و " المستقيم".

مثال// المثلث " ثلاث نقاط مختلفة ولا تقع على مستقيم واحد مع الخطوط الواصلة بينها"

المثني// ثلاث خطوط مختلفة ولا تلتقي بنقطة واحدة مع نقاط تقاطعها.

ملاحظة: من الجدير بالذكر نلاحظ إن مبدأ الثنائية يتحقق على البديهيات الأربع الأولى , لذا فان أي عبارة نحصل عليها من البديهيات الاربع تكون صحيحة.

فمبرهنة 1 هي ثنائية بدئية رقم 1 , مبرهنة 2 هي ثنائية بدئية 2 , بدئية 3 هي ثنائية نفسها , وثنائية بدئية 4 " لاي نقطتين يوجد على الاقل مستقيم واحد يحتويهما".

تعريف " حزمة المستقيمات ": Pencil of lines :
هي مجموعة كل المستقيمات التي تمر بنقطة O . النقطة O تدعى رأس الحزمة " vertex " .

" حزمة النقاط " : Pencil of points
هي مجموعة كل النقاط التي تقع على مستقيم l . المستقيم l يدعى محور الحزمة " axis " .

" الشكل " : هو مجموعة جزئية غير خالية من المستوي الاسقاطي π .

تعريف التشكيلات Configuration :

مجموعة من m من النقاط و n من المستقيمات في π , بحيث ان :

- ❖ كل نقطة من m من النقاط يمر بها عدد ثابت وهو a من المستقيمات .
 - ❖ كل مستقيم من n من المستقيمات يحتوي على عدد ثابت وهو b من النقاط .
- هي تشكيل (m_a, n_b) .

امثلة : تشكيل المثلث $(3_2, 3_2)$

: تشكيل المربع $(4_2, 4_2)$.

: تشكيل الخماسي $(5_2, 5_2)$.

: تشكيل فانو $(7_3, 7_3)$.

: تشكيل $(6_2, 4_3)$ ؟

: تشكيل $(4_3, 6_2)$ ؟

مبرهنة رقم 3 :

اذا كان (m_a, n_b) تشكيلا في المستوي الاسقاطي , فان $ma=nb$.

البرهان:

بما ان كل نقطة من m من النقاط يمر بها a من المستقيمات , فانه ينبغي ان يكون ma من المستقيمات . لكن كل مستقيم يحتوي على b من النقاط , أي ان المستقيم يتكرر b من المرات .

لذلك , يكون عدد الخطوط $n = \frac{ma}{b}$

أي ان $ma=nb$.

تعريف : يقال عن تشكيل انه ثنائي نفسه (self - dual) اذا احتوى على عدد النقاط كعدد المستقيمات .

(m_a, n_b) هو ثنائي نفسه اذا كان $m=n$.

فان $a=b$, لان $am=mb$.

أي ان التشكيل ثنائي نفسه يكون (m_b, m_b) .

سنرمز لهذا التشكيل بالرمز (m_b) .

مثال // المثلث هو (3_2) تشكيل ثنائي نفسه .

تعريف: اربع نقاط في π , لا توجد أي ثلاثة منها على مستقيم واحد, وستة مستقيمات تتعين من ازواج هذه النقاط تكون رباعي زوايا تام (a complete quadrangle) .

تدعى هذه النقاط الرؤوس والمستقيمات التي تتعين من هذه النقاط اضلاع رباعي الزوايا التام سنرمز لرباعي الزوايا التام برؤوسه وعادة نطلق عليه رباعي زوايا , ونقول رباعي الزوايا (ABCD) كما في الشكل التالي:

ضلعان في رباعي الزوايا يقال عنهما متقابلين اذا لم يشتركا باي راس . توجد ثلاثة ازواج من هذه الاضلاع المتقابلة في رباعي الزوايا. نقطة تقاطع زوج من الاضلاع المتقابلة لرباعي الزوايا تدعى نقطة قطرية لرباعي الزوايا . رباعي الزوايا له ثلاث نقاط قطرية.

تكون رؤوس رباعي الزوايا هي: A, B, C, D ,

والاضلاع هي : AB, AC, DA, CD, BD, BC .

الضلع المقابل للضلع AB هو CD ونقطة تقاطعهما G هي نقطة قطرية لرباعي الزوايا (ABCD). لذلك النقاط القطرية لرباعي الزوايا التام تكون مثلثا يدعى المثلث القطري لرباعي الزوايا التام.

$Ax5$ (بديهية فانو) : النقاط القطرية لرباعي الزوايا التام لاتقع على مستقيم واحد.

تعريف: رباعي الاضلاع التام

هو شكل رباعي يتكون من اربعة مستقيمات بحيث لاتكون أي ثلاث منها تلتقي بنقطة واحدة, وست نقاط تتعين من تقاطع ازواج من هذه المستقيمات , تكون رباعي اضلاع تمام (a complete quadrilateral) . المستقيمات التي تكون رباعي اضلاع تام تدعى اضلاعه والنقاط المتعينة من المستقيمات تدعى رؤوسه . نرمز لرباعي الاضلاع التام باضلاعه (abcd) .

راسان لرباعي الاضلاع التام يقال عنهما متقابلين اذا لم يقعا على نفس الضلع . توجد ثلاثة ازواج من هذه الرؤوس المتقابلة في رباعي اضلاع تام. المستقيم الواصل بين زوج من الرؤوس المتقابلة لرباعي اضلاع تام يدعى خطا قطريا (a diagonal line) .

مبرهنة ٤ : ثنائية بديهية فانو

الخطوط القطرية لرباعي اضلاع تام لاتلتقي بنقطة واحدة.

البرهان:

ليكن (abcd) رباعي اضلاع تام . فان الرؤوس لهذا الرباعي هي:

$$a \cap b = A, c \cap d = D$$

$$b \cap c = B, a \cap d = E$$

$$a \cap c = C, b \cap d = F$$

الخطوط القطرية تكون : AD, BE, CF .

$$\text{لتكن } CF \cap BE = P$$

يجب ان نبرهن ان P لاتقع على AD .

ناخذ رباعي الزوايا التام (BCEF), نقاطه القطرية هي: P, A, D .

من بديهية ٥: النقاط القطرية P, A, D لاتقع على مستقيم واحد .

لذلك , فان P لاتقع على المستقيم AD .

مبرهنة ٥:

المستقيم في مستوي اسقاطي يحقق البديهيات الخمس يحتوي على اربع نقاط في الاقل.

البرهان:

ناخذ رباعي زوايا (ABCD) , ولتكن E,F,G نقاطه القطرية . بما ان النقطتين G,F لاتقعان على المستقيم BC , فان المستقيمين GF و BC مختلفان .
 لذلك يجب ان يتقاطعان في نقطة واحدة ولتكن P .
 $P \neq B$, لانه اذا كان $P = B$, فان GF يقطع AB في نقطتين مختلفتين B و G وهذا تناقض مع مبرهنة ١ .
 بنفس الطريقة , $P \neq C$. وكذلك من بديهية ٥ , $P \neq E$.
 وهكذا P هي النقطة الرابعة على الخط BC , التي تختلف عن B , C , و E .

تعريف : مثلثين منظورين من نقطة
 يكون مثلثان في π منظورين (perspective) من نقطة O اذا وجد تناظر متباين بين رؤوس المثلثين بحيث ان كل المستقيمت الواصلة بين الرؤوس المتناظرة تمر من نقطة O .
 تدعى O مركز المنظورية.
 يرمز للمثلثين ABC و A'B'C' المنظورين من نقطة O بحيث ان A, B, C تناظر A', B', C' على التوالي , بالرمز $\Delta ABC \stackrel{O}{\sim} \Delta A'B'C'$.

حسب مبدا الثنائية :
 يكون مثلثان في π منظورين من مستقيم l اذا وجد تناظر متباين بين اضلاع المثلثين بحيث ان كل نقاط تقاطع الاضلاع المتناظرة تقع على المستقيم l . يدعى l محور المنظورية.
 اذا كان ΔABC و $\Delta A'B'C'$ منظورين من l بحيث ان AB, BC, CA تناظر A'B', B'C', C'A' على التوالي يرمز لهذا بالرمز $\Delta ABC \stackrel{l}{\sim} \Delta A'B'C'$.

Ax6: بديهية ديزارك
 اذا كان مثلثان في مستوي اسقاطي منظورين من نقطة , فانهما يكونان منظورين من مستقيم.
 هذا يعني , اذا كان ΔABC و $\Delta A'B'C'$ مثلثين بحيث ان AA', BB', CC' تلتقي جميعا

$$L = AB \cap A'B'$$

$$M = BC \cap B'C' \quad \text{في نقطة O , فان النقاط}$$

$$N = CA \cap C'A'$$

تقع على مستقيم واحد.

مبرهنة ٦: ثنائية بديهية ديزارك
 اذا كان مثلثان في مستوي اسقاطي منظورين من مستقيم , فانهما يكونان منظورين من نقطة.
 البرهان:

ليكن ABC و A'B'C' مثلثين منظورين من مستقيم l , ليكن

$$L = AB \cap A'B'$$

$$M = BC \cap B'C'$$

$$N = CA \cap C'A'$$

فان L , M , N تقع على المستقيم l . يجب ان نبرهن على ان المستقيمت AA', BB', CC' تلتقي بنقطة.

لتكن $O = BB' \cap CC'$ سنبرهن ان AA' يمر من O .

المثلثان LBB' , NCC' منظورين من M , أي ان

$$\Delta LBB' \stackrel{M}{=} \Delta NCC'$$

لذلك من بديهية ٦: النقاط $LB \cap NC = A$, $BB' \cap CC' = O$, و $B'L \cap C'N = A'$ تقع على مستقيم واحد .

وبالتالي فان AA' يمر من O والمثلثين يكونان منظورين من النقطة O .

المجموعات التوافقية (Harmonic Sets)

سنتناول نتيجة اخرى لبديهية فانو , أي مفهوم المجموعات التوافقية

تعريف:

ليكن F شكلا و P نقطة لا تنتمي الى F , نقاط F والنقطة P تعين حزمة مستقيمت حيث P راس الحزمة . ان حزمة المستقيمت مع الراس P تدعى قطع نقطي (Point Section) للشكل F من P .

مثال: رباعي الزوايا التام $ABCD$ و $P \notin ABCD$, وحزمة المستقيمت الاربعة المارة من P مع P تدعى بالقطع النقطي للشكل $ABCD$ من P .

تعريف: ليكن F شكلا و l مستقيما لا ينتمي الى F , مستقيمت F والمستقيم l تعين حزمة من النقاط تدعى قطع حرطي والخط l يسمى محور القطع الحرطي , مثال:

ناخذ رباعي الزوايا التام $ABCD$, فان النقاط A_1, \dots, A_6 المتولدة من تقاطع الخطوط الستة لرباعي الزوايا مع الخط l تولد حزمة من النقاط تسمى قطع خطي.

تعريف:

مجموعة مرتبة من اربع نقاط A, B, C, D على مستقيم l هي مجموعة توافقية من نقاط اذا وجد رباعي زوايا تام فيه A و B نقطتين قطريتين و C و D تقعان على الضلعين الباقيين من رباعي الزوايا التام .

ملاحظات //

- ❖ الرمز $H(AB, CD)$ يرمز للعبارة " A, B, C, D " تكون مجموعة توافقية .
 - ❖ $H(AB, CD) \longleftrightarrow H(BA, CD)$ حسب شروط التعريف.
 - ❖ $H(AB, CD) \longleftrightarrow H(AB, DC)$ نفس السبب السابق بالنسبة C, D
- مثال // في الشكل رباعي الزوايا التام $PQRS$, وفيه نقطة

$$A = PQ \cap RS$$

$$B = SP \cap RQ$$

حيث A, B نقاط قطرية , $C \in PR$
 $D \in SQ$

في الحقيقة النقاط $\{A, B, C, D\}$ هو قطع خراطي للشكل رباعي الزوايا وذلك لان حزمة نقاط التقاطع لخطوط الشكل مع هذا الخط (المفروض هي ستة نقاط , ولكن يوجد زوجان من الخطوط يقطعانه كل زوج في نقطة واحدة وهي عند كل من A, B).

مبرهنة ٧:

$$. H(AB, CD) \leftrightarrow H(BA, CD) \leftrightarrow H(BA, DC) \leftrightarrow H(AB, DC) \leftrightarrow H(AB, CD)$$

تعريف: اذا كان $H(AB, CD)$, فانه يقال بان D النقطة التوافقية الرابعة للنقاط A, B, C , او هي المرافق التوافقي للنقطة C بالنسبة الى A و B .

من مبرهنة ٧ نستنتج اذا كانت D مرافق توافقي الى C بالنسبة الى A و B , فان C هي مرافق توافقي الى D بالنسبة الى A و B .

مبرهنة ٨:

ليكن A, B, C ثلاث نقاط مختلفة على مستقيم l . فانه من الممكن ايجاد مرافق توافقي الى C بالنسبة الى A و B .

البرهان:

حسب $Ax3$: لتكن P_1 نقطة لاتقع على l , وحسب $Ax1$ نصل AP_1 ,

حسب $Ax2$: لتكن P_2 نقطة على AP_1 بحيث ان $P_2 \neq A$
 $P_2 \neq P_1$

نصل BP_1, BP_2, CP_1 . حسب $Ax4$: لتكن $P_4 = CP_1 \cap BP_2$
 $P_3 = AP_4 \cap BP_1$

فان $(P_1 P_2 P_3 P_4)$ هو رباعي الزوايا المطلوب , وفيه A, B نقطتين قطريتين و C نقطة على الضلع P_1P_4 .

لتكن $D = P_2P_3 \cap l$, فتكون D هي المرافق التوافقي الى C بالنسبة الى A و B .

مبرهنة ٩:

لتكن A, B, C ثلاث نقاط على مستقيم l , فان المرافق التوافقي للنقطة C بالنسبة الى A و B يكون وحيدا.

مبرهنة ١٠:

$$H(AB, CD) \leftrightarrow H(CD, AB)$$

نتيجة:

$$H(AB, CD) \leftrightarrow H(CD, AB) \leftrightarrow H(CD, BA) \leftrightarrow H(DC, BA) \leftrightarrow \\ . H(DC, AB) \leftrightarrow H(AB, DC) \leftrightarrow H(BA, DC) \leftrightarrow H(BA, CD)$$

بديهيات الفصل (Separation Axioms) :

على المستقيم الاقليدي كما هو معروف في بديهيات الترتيب وبالاخص Ax9 " توجد نقطة C تقع بين A و B " أي اذا بدانا التحرك من A باتجاه B يجب ان نمر من نقطة C وبالعكس.

ولكن عندما تكون النقاط على دائرة حيث ان A و B نهايتا قطعتان مختلفتان : واحدة , القطعة بالخط الغامق , والآخرى القطعة المنقطعة . اذا كانت C في القطعة بالخط الغامق , يمكن التحرك من A الى B على القطعة المنقطعة بدون المرور من C . لكن اذا وجدت نقطة D على هذه القطعة المنقطعة , لايمكن التحرك من A الى B في أي اتجاه بدون المرور من واحدة او اخرى من النقطتين C او D .

رمز: الرمز " AB / CD " يستعمل ليرمز للفصل لزوج من نقاط A, B بزوج من نقاط C, D .

بديهيات الفصل:

Ax7 : الزوجان A, B و C, D لمجموعة توافقية من النقاط احدهما يفصل الاخر .

بتعبير اخر : اذا كان $H(AB, CD)$, فان AB / CD .

Ax8 : اذا كان الزوجان A, B و D_1, C احدهما يفصل الاخر وكذلك الزوجان A, D_1 و D_2, B احدهما يفصل الاخر , فان الزوجين A, B و C, D_2 احدهما يفصل الاخر.

او بعبارة اخرى: اذا كان \wedge فان AB / CD_2 .
 AB / D_1C
 AD_1 / D_2B

Ax9 : اذا كان الزوجان A, B و C, D احدهما يفصل الاخر فان A, B, C, D نقاط مختلفة.

تعريف قطعة المستقيم بالهندسة الإسقاطية:

لتكن A, B, C ثلاث نقاط مختلفة على خط معلوم l , تعرف القطعة كما يلي:

$$(A - B) = \{X \in l : AB/CX\}$$

حيث النقطة C خارجة عن الخط AB .

ملاحظة : اذا كانت النقطة C لاتقع على القطعة $A-B$ فانه يرمز لها بالرمز $AB // C$.

مبرهنة ١١ : القطعة $AB // C$ هي مجموعة غير خالية.

البرهان:

لتكن A, B, C ثلاث نقاط على مستقيم l .

من مبرهنة ٨ : يمكن ايجاد نقطة D التي هي مرافق توافقي الى C بالنسبة الى A و B .

اذن $H(AB, CD)$,

ومن $Ax7 : AB / CD$,

ومن ثم تقع D على قطعة المستقيم $AB // C$.

المتتابعة التوافقية: مجموعة من نقاط D_1, D_2, \dots, D_n على مستقيم l يحتوي على ثلاث نقاط معلومة A, B, C تكون متتابعة توافقية اذا كانت نقطة D_1 هي مرافق توافقي لواحدة من النقاط A, B, C بالنسبة الى النقطتين الاخرتين. وان أي نقطة تتبع D_1 هي مرافق توافقي لاي واحدة من النقاط التي تسبقها من المتتابعة بالنسبة الى نقطتين اخريتين تسبقها في المتتابعة.

مبرهنة ١٢ : كل مستقيم في المستوي الإسقاطي يحتوي على عدد غير منته من النقاط.

$Ax10$: "بديهية الاستمرارية"

يوجد مستقيم إسقاطي l يحتوي على مجموعة من نقاط متشاكلة تقابليا (isomorphic) مع مجموعة اعداد لنظام الاعداد الحقيقية الموسع.

من هذه البديهية من الممكن ايجاد تناظر متباين بين نقاط المستوي الإسقاطي واعداد نظام عددي هو نظام الاعداد الحقيقية.

المنظورية والاسقاطية (Perspectivity and Projectivity)

تعريف المنظورية من نقطة:

❖ لتكن F و F' شكلين في المستوي الاسقاطي π , يكون الشكلين اعلاه منظورين من نقطة O , اذا تحقق الشرط التالي: "النقاط في F تكون في تناظر متباين مع نقاط الشكل F' , بحيث ان الخطوط الواصلة بين النقاط المتناظرة تمر من نقطة O ويسمى مركز المنظورية.

$$F \stackrel{O}{=} F'_{\Lambda}$$

$$F(A, B, C) \stackrel{O}{=} F'(A', B', C')_{\Lambda}$$

❖ ليكن F و F' شكلا في π , وليكن l مستقيم معلوم , يقال عن F, F' بانهما منظورين من l , اذا تحقق الشرط التالي: "مستقيمات الشكل F في تناظر متباين (1-1 onto) مع مستقيمات الشكل F' , نقاط تقاطع المستقيمات المتناظرة تقع على المستقيم l . يدعى l

$$F \stackrel{l}{=} F'_{\Lambda} \quad \text{محور المنظورية ويعبر عنه بالرمز :}$$

تعريف الاسقاطية:

هدف الهندسة الاسقاطية هو دراسة الخواص الهندسية لشكل يسقط من نقطة ما الى شكل اخر . والاسقاطية "هو تطبيق لمستقيم l الى مستقيم m يعبر عنه بانه تركيب منظوريتين او اكثر , ولكن المنظورية هي دائما (1-1 onto) اذن الاسقاطية (1-1 onto)". وايضا "خاصية شكل لاتتغير باي اسقاط تدعى خاصية اسقاطية".

$$\text{مثال // ليكن } l, m \text{ مستقيمين بحيث ان } l(p_1, p_2, p_3) \stackrel{O}{=} m(p'_1, p'_2, p'_3) \text{*}$$

$$\text{وكذلك } m(p'_1, p'_2, p'_3) \stackrel{O}{=} n(p''_1, p''_2, p''_3) \text{**}$$

$$p_1 \rightarrow p'_1 \rightarrow p''_1$$

$$p_2 \rightarrow p'_2 \rightarrow p''_2 \quad \text{أي ان :}$$

$$p_3 \rightarrow p'_3 \rightarrow p''_3$$

$$\text{من * و ** نحصل على الاسقاطية } l(p_1, p_2, p_3) \stackrel{O}{=} n(p''_1, p''_2, p''_3)$$

ملاحظة // كل المنظوريات هي تناظرات اسقاطية , لكن ليس كل التناظرات الاسقاطية هي منظوريات .

مبرهنة ١٤ :

إذا كانت A, B, C, D تكون مجموعة توافقية من نقاط على مستقيم l , فان القطع النقطي الى $H(AB, CD)$ من نقطة O لاتقع على l هو مجموعة توافقية من مستقيمت.

بعبارة اخرى:

المستقيمت التي تصل مجموعة توافقية من نقاط A, B, C, D على مستقيم l ونقطة O لاتقع على l هي مجموعة توافقية من مستقيمت.

البرهان:

لتكن A, B, C, D نقاط على l بحيث ان $H(AB, CD)$. ولتكن O نقطة لاتقع على l .

نرسم من A خطا يقطع OC و OB في نقطتين P و Q على التوالي.

وليكن BP يقطع OA في نقطة R . فانه يتكون رباعي زوايا تام $(PQRO)$ و قطريه A و B

حيث ان $A = PQ \cap OR, B = PR \cap OQ, C = OP \cap l$

بما ان النقطة التوافقية الرابعة وحيدة , فان RQ يمر من D , المستقيمت AD, AQ, RD, BR تكون رباعي اضلاع وفيه :

OA و OB خطين قطريين , بما ان OC و OD هما المستقيمان الواصلان بين O والراسين P و D , على التوالي , فان المستقيمت OA, OB, OC, OD تكون مجموعة توافقية.

مبرهنة ١٥ : (ثنائية مبرهنة ١٤)

إذا كانت a, b, c, d تكون مجموعة توافقية من مستقيمت تمر من نقطة O , فان نقاط تقاطع هذه المستقيمت مع مستقيم l لا يمر من O هي مجموعة توافقية من نقاط.

بتعبير اخر:

نقاط تقاطع مجموعة توافقية من مستقيمت a, b, c, d تمر من نقطة O مع مستقيم l بحيث ان $O \notin l$, هي مجموعة توافقية من نقاط.

البرهان:

ليكن $A = a \cap l, B = b \cap l, C = c \cap l, D = d \cap l$

ليكن m خطا اخر يمر من A .

لتكن $Q = m \cap BO$ و $P = m \cap Cc$

وبذلك يكون عندنا رباعي أضلاع , أضلاعه:

AD, DQ, PQ, PB وقطريه OA و OB .

لذلك , فان الضلعين DQ و PB يتقاطعان في نقطة R على OA .

ويكون عندنا رباعي زوايا $(PQRO)$ وفيه A و B نقطتين قطريتين , والضلعين من النقطة القطرية الثالثة يقطعان A في النقطتين C و D .

لذلك A, B, C, D تكون مجموعة توافقية من نقاط.

مبرهنة ١٦:

الاسقاطية تحفظ الخاصية التوافقية

بعبارة اخرى:

اسقاط مستقيم الى مستقيم اخر يرسل مجموعة توافقية من نقاط الى اية مجموعة اخرى توافقية من نقاط.

البرهان:

H.W

مبرهنة ١٠ :

إذا كان a و b مستقيمين مختلفين في المستوي c , مستقيم آخر يمر بنقطة تقاطعهما إذا فقط إذا كان c تركيب خطي للمستقيمين a و b .

مبرهنة ١١ :

أي أربع نقاط (مستقيمت) في المستوي الإسقاطي تكون مرتبطة خطياً.

مبرهنة ١٢ :

إذا كانت P_1, P_2, \dots, P_m نقاط غير مرتبطة خطياً بينما النقاط P_1, P_2, \dots, P_{m+1} تكون مرتبطة خطياً, فإن احداثيات النقاط يمكن ان تختار بحيث ان

$$P_1 + P_2 + \dots + P_m = P_{m+1}$$

تعريف التحويل الخطي على R^n :

التطبيق $A: R^n \rightarrow R^n$, الذي له الخواص التالية :

حيث $X, Y \in R^n$ و $\lambda \in R$

$$A(\lambda X) = \lambda A(X) \quad -١$$

$$A(X + Y) = A(X) + A(Y) \quad -٢$$

ان هذا التطبيق يدعى تحويل خطي .

وإذا كان $|A| \neq 0$, فان هذا التطبيق يدعى تحويل خطي غير انفرادي.

$$A(X) = AX = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & \dots & a_{1n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{n1} & \cdot & \cdot & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n \end{bmatrix}$$

ملاحظة : من التطبيقات الهندسية عن الارتباط الخطي

إذا كان ABC و $A'B'C'$ مثلثين منظورين من نقطة O , فإنهما يكونان منظورين من مستقيم.

وثنائية العبارة اعلاه ايضا تطبيقا هندسيا اخر عن الارتباط الخطي.

وايضا بديهية فانو , والخطوط القطرية لرباعي اضلاع تام لالتقي بنقطة واحدة.

النظام الاحداثي للمستقيم:

إذا كانت $A(a_1, a_2, a_3)$ و $B(b_1, b_2, b_3)$ نقطتين مختلفتين على مستقيم l , فان لاية نقطة

$P = (P_1, P_2, P_3)$ على المستقيم l , نستطيع ايجاد عددين حقيقيين λ_1 و λ_2 بحيث ان:

$$P_i = \lambda_1 a_i + \lambda_2 b_i \quad (i= 1,2,3)$$

$$\begin{vmatrix} P_1 & P_2 & P_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{حيث ان}$$

لان

$$\begin{vmatrix} \lambda_1 a_1 + \lambda_2 b_1 & \lambda_1 a_2 + \lambda_2 b_2 & \lambda_1 a_3 + \lambda_2 b_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0$$

مثال //

إذا كانت $A(1,2,3)$, و $B(1,0,1)$, فان نقطة $P(P_1, P_2, P_3)$ تقع على المستقيم AB اذا كان

$$\begin{vmatrix} P_1 & P_2 & P_3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

أي ان , $P_1 + P_2 - P_3 = 0$.

وعندما النقطة P تقع على الخط AB , فانه يمكن ايجاد λ_1 و λ_2 بحيث ان:

$$P_2 = 2\lambda_1 = 0$$

$$P_1 = \lambda_1 + \lambda_2 = 0$$

$$P_3 = 3\lambda_1 + \lambda_2 = 0$$

بحل أي معادلتين منها , نجد λ_1 و λ_2 . ذلك , اذا كانت $(P_1, P_2, P_3) = (2, 3, 5)$, فان

$$\lambda_1 + \lambda_2 - 2 = 0$$

$$2\lambda_1 - 3 = 0$$

$$3\lambda_1 + \lambda_2 - 5 = 0$$

$$\lambda_1 = 2/3, \lambda_2 = 1/2$$

ملاحظة: ان تعيين $[\lambda_1, \lambda_2]$ للنقطة P بالنسبة الى A و B لا يتم بطريقة وحيدة.

حيث اذا اخترنا ثلاثيات مختلفة لتمثل A و B فان λ_1 و λ_2 سيختلفان .

ذلك , اذا اخذنا (2.1 , 2.2 , 2.3) لتمثل A , فان $\lambda_1 = 3/4, \lambda_2 = 1/2$

للحل هذه المشكلة يمكن اخذ نقطة ثالثة $C(c_1, c_2, c_3)$ على المستقيم باختيار تمثيلات للنقطتين A و B بحيث ان C تتعين من $[1, 1]$. ان وحدانية $[\lambda_1, \lambda_2]$ يمكن ان تعين لاية نقطة على المستقيم نسبة الى تمثيلات A و B .

تغيير الاحداثيات:

اذا كانت النقطة $P = (x_1, x_2, x_3)$ لها احداثيات $[\lambda_1, \lambda_2]$ بالنسبة الى النقاط $A = (a_1, a_2, a_3)$,
 $B = (b_1, b_2, b_3)$, و $C = A + B$, فان

$$X_i = \lambda_1 a_i + \lambda_2 b_i, i = 1, 2, 3 \dots \dots \dots (١)$$

لتكن $[\lambda'_1, \lambda'_2]$ هي احداثيات P فيما يخص نظاما اخر $A' = (a'_1, a'_2, a'_3)$, $B' = (b'_1, b'_2, b'_3)$,
و

$$C' = A' + B'$$

$$X_i = \lambda'_1 a'_i + \lambda'_2 b'_i, i = 1, 2, 3 \dots \dots \dots (٢)$$

يجب ان نعين العلاقة بين $[\lambda_1, \lambda_2]$ و $[\lambda'_1, \lambda'_2]$.

لتكن احداثيات A و B بالنسبة الى الاحداثي الثاني $[a, c]$ و $[b, d]$, على التوالي , أي ان

$$a_i = \lambda a'_i + \lambda'_i b'_i, i = 1, 2, 3 \dots \dots \dots (٣)$$
$$b_i = \lambda a'_i + \lambda'_i b'_i$$

بما ان A و B مختلفتين , فان

$$\begin{aligned} a/c &\neq b/d \\ ad - bc &\neq 0 \end{aligned}$$

أي ان

بتعويض هذه القيم الى a_i و b_i في (١) , نحصل على

$$\begin{aligned} X_1 &= \lambda_1(aa'_i + cb'_i) + \lambda_2(ba'_i + db'_i) \\ &= (\lambda_1a + \lambda_2b)a'_i + (\lambda_1c + \lambda_2d)b'_i \end{aligned}$$

بالمقارنة مع (٢) , يكون

$$\begin{aligned} \lambda'_1 &= (\lambda_1a + \lambda_2b) \\ \lambda'_2 &= (\lambda_1c + \lambda_2d) \end{aligned}$$

أي ان,

$$(٤) \dots \dots \begin{bmatrix} \lambda'_1 \\ \lambda'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix}$$

حيث ان $ad - bc \neq 0$.

لذلك , اذا كانت p على مستقيم لها احداثيات $[\lambda_1, \lambda_2]$ بالنسبة الى A,B,C , فان الاحداثيات الجديدة $[\lambda'_1, \lambda'_2]$ الى p بالنسبة الى ثلاث نقاط اخرى A' , B' , C' .

مبرهنة ١٧ :

ليكن | مستقيما نظامه الاحداثي $[\lambda_1, \lambda_2]$ و m مستقيما نظامه الاحداثي $[\lambda'_1, \lambda'_2]$. فان الاسقاطية بين | و m يمكن ان يعبر عنها بطريقة وحيدة بالشكل:

$$\begin{bmatrix} \lambda'_1 \\ \lambda'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix}$$

حيث ان $ad - bc \neq 0$.

النسبة التبادلية Cross Ratio

تعريف: النسبة التبادلية لاربعة اعداد a, b, c, d هي

$$R(a,b,c,d) = \frac{(a-c)(b-d)}{(a-d)(b-c)}$$

مبرهنة ١٨ :

إذا كانت $R(a,b,c,d) = k$ فإن النسب التبادلية الستة المختلفة هي:

$$R(a,b,c,d) = k$$

$$R(b,a,c,d) = 1/k$$

$$R(a,c,b,d) = 1-k$$

$$R(c,a,b,d) = 1/(1-k)$$

$$R(c,b,a,d) = 1 - (1/(1-k)) = k/(k-1)$$

$$R(b,c,a,d) = (k-1)/k$$

مبرهنة ١٩ :

إذا كان اثنان من الأعداد الأربعة a, b, c, d متساويين , فإن النسبة التبادلية تكون $0, \infty$ أو 1 .

وبالعكس , إذا كانت النسبة التبادلية $R(a,b,c,d)$ تساوي $0, \infty$, أو 1 , فإنه في الأقل اثنين من الأعداد a, b, c, d متساويين.

البرهان: إذا كان $a = b$, فإن

$$R(a,a,c,d) = \frac{(a-c)(a-d)}{(a-d)(a-c)} = 1$$

إذا كان $b = c$, فإن

$$R(a,b,b,d) = \frac{(a-b)(b-d)}{(a-d)(b-b)} = \infty$$

إذا كان $a = c$, فإن

$$R(a,b,a,d) = \frac{(a-a)(b-d)}{(a-d)(b-a)} = 0$$

مبرهنة ٢٠ :

$$R(a,b,c,d) \cdot R(a,b,d,e) = R(a,b,c,e)$$

البرهان:

$$R(a,b,c,d) * R(a,b,d,e) = \frac{(a-c)(b-d)}{(a-d)(b-c)} * \frac{(a-d)(b-e)}{(a-e)(b-d)}$$

$$= \frac{(a-c)(b-e)}{(b-c)(a-e)} = R(a,b,c,e)$$

مبرهنة ٢١:

النسبة التبادلية لاربع نقاط مختلفة لا يمكن ان تكون ∞ , 0, او 1 .

مبرهنة ٢٢:

اذا كانت $X = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix}$ و $Y = \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_3 \end{bmatrix}$ نقطتين على مستقيم , فان الشرط $Z = aX + bY$ و

$S = cX + dY$ تكون توافقية بالنسبة الى X و Y هو ان

$$\frac{c}{d} + \frac{a}{b} = 0, [a,b] \neq [c,d]$$

مبرهنة ٢٣:

$$R(A,B,C,D) = -1 \leftarrow H(AB,CD)$$

استنكار بعض التعاريف الخاصة بالجبر الخطي :

تعريف الارتباط الخطي : يقال لمجموعة متجهات $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$ من فضاء متجهات V , بانها

مرتبطة خطيا اذا فقط اذا يوجد اعداد k_1, k_2, \dots, k_n ليست جميعها اصفارا , بحيث :

$$k_1 \vec{v}_1 + k_2 \vec{v}_2 + \dots + k_n \vec{v}_n = 0$$

ويقال للمجموعة $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$ مستقلة خطيا اذا فقط اذا

$$k_1 \vec{v}_1 + k_2 \vec{v}_2 + \dots + k_n \vec{v}_n = 0$$

فان ,

$$k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$$

//مثال

المتجهات $u_1 \rightarrow (1,0,0), u_2 \rightarrow (0,1,0), u_3 \rightarrow (0,0,1), u_4 \rightarrow (2,3,-5)$

مرتبطة خطيا , لان

$$2u_1 \rightarrow + 3u_2 \rightarrow - 5u_3 \rightarrow - u_4 \rightarrow = 0$$

تعريف التركيب الخطي:

ليكن V فضاء متجهات , وان $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ متجهات في V , يقال للمتجه \vec{v} في V بانه

تركيب خطي من $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$, اذا امكن التعبير عن \vec{v} بالشكل التالي:

$$V = k_1 \vec{v}_1 + k_2 \vec{v}_2 + \dots + k_n \vec{v}_n \text{ , حيث ان } k_1, k_2, \dots, k_n \text{ اعداد.}$$

//مثال

ليكن $\vec{v}_1 = (1,2,-1), \vec{v}_2 = (1,0,-1)$ متجهين من R^3 , هل ان المتجه $\vec{v} = (1,0,2)$ تركيب خطي الى \vec{v}_1, \vec{v}_2 .

//الحل

يجب ان نجد عددين k_1, k_2 لكي يكون \vec{v} تركيب خطي الى \vec{v}_1, \vec{v}_2 , بحيث ان

$$V = k_1 \vec{v}_1 + k_2 \vec{v}_2$$
$$(1,0,2) = k_1(1,2,-1) + k_2(1,0,-1)$$

أي :

$$k_1 + k_2 = 1$$

$$2k_1 = 0$$

$$-k_1 - k_2 = 2$$

هذه المنظومة ليس لها حل , اذن \vec{v} ليست تركيب خطي من \vec{v}_1, \vec{v}_2 .

الفصل الثاني عشر

المستوى الإسقاطي التحليلي

نموذج اقليدي للمستوي الإسقاطي:
تبدأ دراسة الطرق الجبرية والاحداثية في المستوى الإسقاطي بانشاء نموذج تحليلي الذي فيه كل نقطة تمثل بثلاثي من اعداد حقيقية يدعى احداثيات متجانسة للنقطة .
نموذج اقليدي يستعمل في تكوين النموذج التحليلي.
- في الفضاء الثلاثي الاقليدي , نأخذ مجموعة كل المستقيمات التي تمر بنقطة O لهذا الفضاء .
بما ان كل زوج من المستقيمات المختلفة لهذه المجموعة تعين مستويا , فالمجموعة الناتجة من المستويات مع كل المستقيمات التي تمر من O , تكون نموذجا للمستوى الإسقاطي.

تفسير هذا النموذج يكون كما يلي:
تفسر " النقاط " بانها مستقيمات تمر من O .
و "المستقيمات " بانها مستويات تمر من O .
والعلاقة " نقطة على مستقيم " بانها مستقيم في مستوى.
ان المستقيمات والمستويات التي تمر من نقطة O في الفضاء الاقليدي تحقق بديهيات الوقوع والوجود لنقاط ومستقيمات المستوى الإسقاطي.

نموذج تحليلي:
نقاط ومستقيمات المستوى الإسقاطي تمثل بمستقيمات ومستويات الفضاء – الثلاثي الاقليدي .
- في الفضاء الثلاثي الاقليدي , X_{12}, X_{13}, X_{23} ثلاثة مستويات متعامدة بالتبادل . فان كل نقطة P في هذا الفضاء تناظر ثلاثي من الاعداد الحقيقية (X_1, X_2, X_3) , حيث ان X_1 , X_2 , X_3 هي المسافات من P الى هذه المستويات , على التوالي.
نأخذ أي مستقيم يمر من نقطة الاصل O لهذا النظام الاحداثي . يتعين المستقيم من مجموعة من ثلاثة اعداد متجهة $(a_1, a_2, a_3) \neq (0,0,0)$. أي مجموعة اخرى (ta_1, ta_2, ta_3) تعين نفس الخط , حيث t أي عدد حقيقي لا يساوي صفر.
اذن العدد الثلاثي (a_1, a_2, a_3) يكافئ عددا ثلاثيا اخر (b_1, b_2, b_3) اذا وجد عددا $K \neq 0$, بحيث
$$(b_1, b_2, b_3) = K(a_1, a_2, a_3)$$

مجموعة كل الثلاثيات المتكافئة بالتبادل تكون صف تكافؤ يرمز له بالرمز $\{a_1, a_2, a_3\}$.
بما انه يوجد تناظر متباين بين صفوف التكافؤ $\{X_1, X_2, X_3\}$, التي ليست جميع عناصرها صفرية , والمستقيمات التي تمر بنقطة الاصل في الفضاء الثلاثي الاقليدي , وبما ان هذه

المستقيمت تمثل نموذجا لنقاط المستوي الاسقاطي , تكون صفوف التكافؤ هذه نموذجا تحليليا لنقاط المستوي الاسقاطي.

أي تمثيل مثل (a_1, a_2, a_3) لصف تكافؤ يدعى إحداثيات متجانسة لنقطة في المستوي الاسقاطي الحقيقي, اذا كان الثلاثي العددي يتناسب مع ثلاثي لاعداد حقيقية. فمثلا, $(1,2,3)$ و $(2,4,6)$ تمثلان نفس النقطة الحقيقية.

ان المستقيم في المستوي الاسقاطي يناظر مستويا يمر بنقطة الاصل للفضاء الثلاثي الاقليدي . معادلة هذا المستوي تعرف كما يلي:

$$d_1x_1 + d_2x_2 + d_3x_3 = 0$$

حيث ان d_1, d_2, d_3 تتناسب مع مجموعة من ثوابت حقيقية , وان $(d_1, d_2, d_3) \neq (0,0,0)$. بما ان النقطة التي تحقق المعادلة اعلاه , تحقق ايضا المعادلة

$$kd_1x_1 + kd_2x_2 + kd_3x_3 = 0$$

حيث k أي عدد لايساوي صفر, فان المستوي يتعين اما بثلاثي الاعداد الحقيقية (d_1, d_2, d_3) ليست جميع العناصر صفرية, او باي ثلاثي اخر (kd_1, kd_2, kd_3) , حيث ان $k \neq 0$, لذلك يوجد تناظر متباين بين صفوف التكافؤ $(d_1, d_2, d_3) \neq (0,0,0)$ والمستويات التي تمر بنقطة الاصل , وبالتالي كذلك , بين صفوف التكافؤ هذه ومستقيمت المستوي الاسقاطي . أي تمثيل (d_1, d_2, d_3) لصف تكافؤ $\{d_1, d_2, d_3\}$ يدعى إحداثيات متجانسة لمستقيم في المستوي الاسقاطي الحقيقي.

أي ان النقاط والمستقيمت في المستوي الاسقاطي التحليلي تكون صفوف تكافؤ , وهذا يوضح مبدأ الثنائية في المستوي الاسقاطي.

معادلات النقاط والمستقيمت:

مبرهنة ١:

النقطة التي إحداثياتها المتجانسة (a_1, a_2, a_3) تقع على المستقيم الذي إحداثياته المتجانسة

$$d_1a_1 + d_2a_2 + d_3a_3 = 0 \quad \text{إذا فقط إذا } (d_1, d_2, d_3)$$

إذا كانت الإحداثيات المتجانسة للنقطة (X_1, X_2, X_3) , فان المعادلة أعلاه تصبح:

$$d_1x_1 + d_2x_2 + d_3x_3 = 0$$

وتدعى معادلة المستقيم.

معادلة النقطة (a_1, a_2, a_3) هي: $a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = 0$

مثال: معادلة النقطة $(1,2,3)$ هي $x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0$.

واحداثيات النقطة $X_1 - X_3 = 0$ هي $(1,0,-1)$.

مبرهنة ٢:

ثلاث نقاط مختلفة $A(X_1, X_2, X_3)$, $B(Y_1, Y_2, Y_3)$ و $C(Z_1, Z_2, Z_3)$ تقع على مستقيم واحد اذا

و فقط اذا

$$\begin{vmatrix} X_1 & X_2 & X_3 \\ Y_1 & Y_2 & Y_3 \\ Z_1 & Z_2 & Z_3 \end{vmatrix} = 0$$

مبرهنة ٣: (ثنائية مبرهنة ٢)

ثلاثة مستقيمت مختلفة $a[X_1, X_2, X_3]$, $b[Y_1, Y_2, Y_3]$ و $c[Z_1, Z_2, Z_3]$ تلتقي بنقطة واحدة اذا فقط اذا

$$\begin{vmatrix} X_1 & X_2 & X_3 \\ Y_1 & Y_2 & Y_3 \\ Z_1 & Z_2 & Z_3 \end{vmatrix} = 0$$

مثال:

النقاط الثلاث $A(1,0,0)$, $B(0,1,0)$ و $C(0,0,1)$ لاتقع على مستقيم واحد , لان

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$

مثال:

النقاط الثلاث $A(1,0,-1)$, $B(2,3,1)$ و $C(-1,1,2)$ تقع على مستقيم واحد لان

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

ومن مبدأ الثنائية , تلتقي المستقيمت $a[1,0,-1]$, $b[2,3,1]$ و $c[-1,1,2]$ بنقطة واحدة .

مبرهنة ٤:

معادلة المستقيم المتعين من النقطتين المختلفتين $A(Y_1, Y_2, Y_3)$ و $B(Z_1, Z_2, Z_3)$ تكون

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ Y_1 & Y_2 & Y_3 \\ Z_1 & Z_2 & Z_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} Y_2 & Y_3 \\ Z_2 & Z_3 \end{vmatrix} x_1 + \begin{vmatrix} Y_3 & Y_1 \\ Z_3 & Z_1 \end{vmatrix} x_2 + \begin{vmatrix} Y_1 & Y_2 \\ Z_1 & Z_2 \end{vmatrix} x_3 = 0$$

واحداثياته :

$$\left[\begin{vmatrix} Y_2 & Y_3 \\ Z_2 & Z_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} Y_3 & Y_1 \\ Z_3 & Z_1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} Y_1 & Y_2 \\ Z_1 & Z_2 \end{vmatrix} \right]$$

مثال :

معادلة المستقيم الذي يصل النقطتين $P(2,1,-3)$ و $Q(4,-2,4)$ تكون

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ 2 & 1 & -3 \\ 4 & -2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} x_1 + \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} x_2 + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} x_3 = 0$$

$$= -2x_1 - 20x_2 - 8x_3 = 0$$

$$x_1 + 10x_2 + 4x_3 = 0$$

فتكون احداثيات المستقيم [1,10,4].
او يحل السؤال حسب خواص المحدد أي:

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ 2 & 1 & -3 \\ 4 & -2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} x_1 - \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} x_2 + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} x_3 = 0$$

$$= -2x_1 - 20x_2 - 8x_3 = 0$$

$$x_1 + 10x_2 + 4x_3 = 0$$

ونحصل على نفس احداثيات المستقيم اعلاه [1,10,4].

مبرهنة ٥ (ثنائية مبرهنة ٤):

معادلة النقطة المتعينة من تقاطع المستقيمين المختلفين $a[X_1, X_2, X_3]$ و $b[Y_1, Y_2, Y_3]$ تكون

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ Y_1 & Y_2 & Y_3 \\ Z_1 & Z_2 & Z_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} Y_2 & Y_3 \\ Z_2 & Z_3 \end{vmatrix} x_1 + \begin{vmatrix} Y_3 & Y_1 \\ Z_3 & Z_1 \end{vmatrix} x_2 + \begin{vmatrix} Y_1 & Y_2 \\ Z_1 & Z_2 \end{vmatrix} x_3 = 0$$

واحداثياتها تكون: $\left[\begin{vmatrix} Y_2 & Y_3 \\ Z_2 & Z_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} Y_3 & Y_1 \\ Z_3 & Z_1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} Y_1 & Y_2 \\ Z_1 & Z_2 \end{vmatrix} \right]$

//مثال

المستقيمات الثلاثة:

$$p: 7x_1 - 11x_2 - 5x_3 = 0$$

$$q: 3x_1 - 3x_2 - x_3 = 0$$

$$r: 10x_1 - 11x_2 - 4x_3 = 0$$

$$\begin{vmatrix} 7 & -11 & -5 \\ 3 & -3 & -1 \\ 10 & -11 & -4 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{تلقي بنقطة واحدة , لان}$$

معادلة نقطة التقاطع تكون:

$$\begin{vmatrix} X_1 & X_2 & X_3 \\ 3 & -3 & -1 \\ 7 & -11 & -5 \end{vmatrix} = 4X_1 + 8X_2 - 12X_3 = 0$$

لذا فان احداثياتها تكون: (4,8,-12) او (1,2,-3).

ملاحظة مهمة جدا حول المثال اعلاه: نأخذ أي مستقيمين , حتى ولو اختلفت القيم فيكون الناتج من مضاعفات ناتج المستقيمت الأخرى.
أي: لو نأخذ الاحتمالات التالية

$$\begin{vmatrix} X_1 & X_2 & X_3 \\ 7 & -11 & -5 \\ 3 & -3 & -1 \end{vmatrix} = -4X_1 - 8X_2 + 12X_3 = 0$$

لذا فاحداثيات نقطة التقاطع هي (-1,-2,3) .

$$\begin{vmatrix} X_1 & X_2 & X_3 \\ 10 & -11 & -4 \\ 7 & -11 & -5 \end{vmatrix} = 11X_1 + 22X_2 - 33X_3 = 0$$

فاحداثيات نقطة التقاطع هي : (1,2,-3) .

$$\begin{vmatrix} X_1 & X_2 & X_3 \\ 7 & -11 & -5 \\ 10 & -11 & -4 \end{vmatrix} = 33X_1 - 22X_2 + 33X_3 = 0$$

لذا , احداثيات نقطة التقاطع هي : (3,-2,3)

$$\begin{vmatrix} X_1 & X_2 & X_3 \\ 10 & -11 & -4 \\ 3 & -3 & -1 \end{vmatrix} = -1X_1 - 2X_2 + 3X_3 = 0$$

لذا , احداثيات نقطة التقاطع هي: (-1,-2,3) .

$$\begin{vmatrix} X_1 & X_2 & X_3 \\ 3 & -3 & -1 \\ 10 & -11 & -4 \end{vmatrix} = X_1 + 2X_2 - 3X_3 = 0$$

لذا , احداثيات نقطة التقاطع هي : (1,2,-3) .

المعنى الهندسي للارتباط الخطي:

رمز: اذا كان V متجه مركباته (a_1, a_2, a_3) فالرمز $P(V)$, سيعني ان احداثيات P المتجانسة هي (a_1, a_2, a_3) , كمثل , اذا كانت مركبات المتجه W هي: $(1,0,-1)$, فان احداثيات P(W) هي $(1,0,-1)$ و $P(2W)$ هي $(2,0,-2)$.

تعريف الضرب العددي : Scalar Multiplication

$$C P(V) = P(CV)$$

ضرب نقطة P بعدد C , هو ببساطة ضرب المتجه الممثل الى P بالعدد C .

تعريف (الجمع) :

إذا كان

$$V = C_1V_1 + C_2V_2 + \dots + C_mV_m \neq 0$$

فإن

$$C_1P_1(V_1) + C_2P_2(V_2) + \dots + C_mP_m(V_m) = P(C_1V_1 + C_2V_2 + \dots + C_mV_m)$$

و

$$C_1P_1(V_1) + C_2P_2(V_2) + \dots + C_mP_m(V_m) = 0$$

أي يعني أن

$$C_1V_1 + C_2V_2 + \dots + C_mV_m = 0$$

//مثال

$$P_1(-5V_1) + P_2(V_2) + P_3(-3V_3) = 0 \text{ , يعني أن}$$

$$-5V_1 + V_2 - 3V_3 = 0$$

وبذلك فإن النقاط P_1, P_2, P_3 مرتبطة خطياً.

تعريف:

النقاط $P_1(V_1), \dots, P_m(V_m)$ تكون مرتبطة أو غير مرتبطة خطياً إذا كانت المتجهات V_1, \dots, V_m مرتبطة أو غير مرتبطة خطياً.

تعريف:

إذا كانت النقاط P_1, P_2, \dots, P_m مرتبطة خطياً , فإنه يوجد في الأقل واحد من الأعداد

C_1, \dots, C_m لا يساوي صفراً , بحيث أن

$$C_1P_1 + C_2P_2 + \dots + C_mP_m = 0$$

ليكن $C_1 \neq 0$

$$P_1 = -1/C_1 (C_2P_2 + C_3P_3 + \dots + C_mP_m)$$

فإنه يقال بأن النقطة P_1 هي تركيب خطي للنقاط P_2, \dots, P_m .

مبرهنة ٦:

نقطتان (مستقيمان) مختلفتان تكونان مرتبطتين خطياً إذا وفقط إذا كانتا متساويتين.

مبرهنة ٧:

ثلاث نقاط مختلفة تكون مرتبطة خطياً إذا وفقط إذا كانت تقع على مستقيم واحد.

مبرهنة ٨:

ثلاثة مستقيماًت مختلفة تكون مرتبطة خطياً إذا وفقط إذا كانت تلتقي بنقطة واحدة.

مبرهنة ٩:

إذا كانت A و B نقطتين مختلفتين في المستوي , C نقطة أخرى تقع على المستقيم AB إذا وفقط إذا كانت C تركيب خطي للنقطتين A و B .

هندسة اولية:

سنبرهن بعض مبرهنات اقليدس بطريقة هلبرت

مبرهنة ٦٦:

في المثلث ABC , اذا كان $A-B \cong A-C$ وان G, F نقطتان بحيث ان $A-B-F$ و $A-C-G$.
فان $\angle CBF \cong \angle BCG$ و $\angle ABC \cong \angle ACB$.

البرهان:

من Ax9 : توجد نقطة G بحيث ان $A-C-G$.

من Ax11 : توجد نقطة F من جهة A التي تحتوي B بحيث ان $A-G \cong A-F$

من Th 52 + Ax11 : فان $A-B-F$.

ناخذ المثلثين ABG و ACF , وفيهما:

$\angle A \cong \angle A$ و $A-G \cong A-F$, $A-B \cong A-C$

فانه من Th SAS : $\Delta ABG = \Delta ACF$

لذا فان $\angle ABG \cong \angle ACF$, $\angle AGB \cong \angle AFC$, $B-G \cong F-C$

من مبرهنة طرح القطع : نستنتج ان $B-F \cong C-G$.

ومن مبرهنة SAS : $\Delta FBC = \Delta GCB$.

لذا فان $\angle CBF \cong \angle BCG$ وكذلك $\angle BCF \cong \angle CBG$

وبذلك يكون عندنا $\angle ABG \cong \angle ACF$ و $\angle BCF \cong \angle CBG$.

بما ان $A-C-G$, $A-B-F$, ومن تعريف شعاع بين شعاعين و Th 46 : الشعاع \vec{BC} يقع في

داخل $\angle ABG$ وان \vec{CB} يقع في داخل $\angle ACF$. لذلك من مبرهنة طرح الزوايا , فان

$\angle ABC \cong \angle ACB$.

مبرهنة ٦٧:

اذا كانت زاويتان في مثلث متطابقتين , فانه يتطابق كذلك الضلعان المقابلان لهما.

البرهان:

ليكن ABC مثلث معلوم وفيه $\angle B \cong \angle C$

يجب ان نبرهن ان $A-B \cong A-C$

وحسب Th62 يتحقق واحد فقط ممايلي:

$$A-B \cong A-C$$

$$A-B < A-C$$

$$A-C < A-B$$

الاحتمال الثاني عندما $A-B < A-C$: وحسب تعريف العلاقة اصغر من على القطع توجد نقطة

D بحيث ان

$$A-D-B \quad -1$$

$$A-C \cong B-D \quad -2$$

والان في المثلثين ABC , BCD وفيهما :

بالفرض $\angle BDC \cong \angle ACB$

وحسب Ax12 : $B-C \cong B-C$ وكذلك بالفرض $A-C \cong B-D$

حسب ThSAS : يتطابق المثلثان ومن التطابق ينتج ان : $\angle 1 \cong \angle 2$

ولكن بالفرض $\angle 2 \cong \angle 3$

وحسب Ax12 : $\angle 1 \cong \angle 3$

وحسب Th? : الشعاع \vec{CD} يقع داخل $\angle 3$.

وبالتالي فان الشعاعين \vec{CA} و \vec{CD} يقعان في نفس الجهة من الخط CB .

بما ان $\angle 1 \cong \angle 3$ تناقض مع Ax14 ؟

اذن الاحتمال الاول مرفوض.

الاحتمال الثاني مرفوض ايضا.

والاحتمال الوحيد المقبول هو $A-C \cong A-B$.

مبرهنة ٦٨ :

لتكن A-B قطعة معلومة وان $A-C \cong A-D$ و $B-C \cong B-D$ وكانت النقطتين D,C تقعان

في نفس الجهة من الخط AB فان $C=D$.

البرهان : H.W

مبرهنة ٦٩ : (S.S.S)

اذا كانت ثلاثة اضلاع من مثلث تطابق ثلاثة اضلاع من مثلث اخر فان المثلثين يتطابقان.

البرهان:

ليكن ABC و DEF مثلثين وفيهما: الاضلاع الثلاثة من احدهما تطابق الاضلاع الثلاثة على التوالي من المثلث الاخر.

لكي نبرهن ان المثلثين يتطابقان من مبرهنة SAS يجب ان نبرهن ان زوجا واحدا من الزوايا

تكون متطابقة , وليكن $\angle ABC \cong \angle DEF$.

نفرض ان العبارة خطأ.

من Th 62 : $\angle ABC < \angle DEF$

$\angle DEF < \angle ABC$

نفرض ان $\angle DEF < \angle ABC$

من تعريف العلاقة اصغر من : فانه يوجد شعاع \vec{BG} في داخل $\angle ABC$ بحيث ان

$\angle GBC \cong \angle DEF$. من Ax11 , توجد نقطة H على \vec{BG} بحيث ان $B-H \cong E-D$.

وبما ان $B-C \cong E-F$ فانه من SAS , $\triangle DEF \cong \triangle HBC$.

ولذلك $H-C \cong D-F$ وبما ان $A-C \cong D-F$, فان $A-C \cong H-C$ وبالمثل

$A-B \cong H-B$, وبما ان A و H في نفس الجهة من BC , فانه من Th68 , $A=H$,

(تناقض)؟.

وبنفس الطريقة اذا كان $\angle ABC < \angle DEF$. لذلك $\angle ABC \cong \angle DEF$ وان $\triangle ABC \cong \triangle DEF$.

مبرهنة ٧٠ : (A.S.A)

اذا كانت زاويتان وضلع مشترك بينهما في مثلث تطابق على التوالي زاويتين وضلع مشترك

بينهما من مثلث اخر , فان المثلثين يتطابقان .

البرهان:

ليكن ABC, DEF مثلثين وفيهما :

$\angle ABC \cong \angle DEF$ و $\angle ACB \cong \angle DFE$ و $B-C \cong E-F$

يجب ان نبرهن ان: $\triangle ABC \cong \triangle DEF$

نفرض ان $D-E < A-B$, فانه توجد نقطة G بحيث ان A-G-B وان $B-G \cong D-E$ وبما

ان $B-C \cong E-F$, و $\angle GBC \cong \angle DEF$, فانه من SAS , $\triangle GBC \cong \triangle DEF$.

لذا فان $\angle GCB \cong \angle DFE$, لكن $\angle DFE \cong \angle ACB$, فان $\angle GCB \cong \angle ACB$. لكن بما ان

A-G-B , فان $\angle GCB < \angle ACB$ تناقض مع Th62 .
وبنفس الطريقة , اذا كان $A-B < D-E$. لذلك فان $A-B \cong D-E$, ومن SAS , فان
 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$.

تعريف:

اذا قطع مستقيمين بقاطع في نقطتين مختلفتين A, B . فالزوايا التي تكون القطعة A-B كجزء
من ضلع , تدعى زوايا داخلية . تدعى الزوايا الاخرى خارجية .

الزاويتان اللتان يكون راسيهما النقطتين A, B وفي نفس الجهة من القاطع احدهما داخلية
والاخرى خارجية تدعيان زاويتين متناظرتين .

زاويتان غير متجاورتان على جهتي القاطع المتعاكستين وكلا منهما داخلية تدعيان زاويتين
داخليتين متبادليتين .

مبرهنة ٧٢:

اذا قطع مستقيمين بقاطع وكانت الزاويتان الداخليتان المتبادلتان متطابقتين , فان المستقيمين
لايتقاطعان.

البرهان:

ليكن المستقيم k يقطع المستقيمان المختلفان l, m في النقطتين المختلفتين A, B على التوالي بحيث
ان $\angle 1 \cong \angle 2$.

يجب ان نبرهن ان الخط l لايقطع الخط m .
نفرض العكس أي ان الخطين l, m يتقاطعان في نقطة ولتكن C .
نناقش القطعة A-C والنقطة B على المستقيم BC .

وحسب Ax11 : توجد نقطة G على الشعاع المعاكس للشعاع \vec{BC} بحيث ان $A-C \cong G-B$.
أي انه توجد نقطة G بحيث ان

$$G-B-C \quad -1$$

$$A-C \cong G-B \quad -2$$

والان نطابق المثلثين ABC, ABG

$$(\text{حسب Ax12}) \quad A-B \cong A-B$$

$$\text{بالعمل} \quad A-C \cong G-B$$

$$\angle 1 \cong \angle 2 \text{ بالفرض.}$$

وحسب Th SAS : يتطابق المثلثين ومن التطابق ينتج ان $\angle 3 \cong \angle 4$ و $\angle 2, \angle 4$ تكافؤان زوج
خطي وهما $\angle 1, \angle 3$.

وحسب تعريف ؟ $\angle 2, \angle 4$ متكاملتين,

ولكن $\angle 2, \angle 4$ يكونان زوجا خطيا.

اذن الشعاعين \vec{AG}, \vec{AC} متعاكسين.

الان Ax6 + C-A-G : النقاط C, A, G مختلفة وعلى خط واحد.
والخطين m, CG يتقاطعان في نقطتين مختلفتين وهذا (تناقض مع Th2) .

اذن الفرضية مرفوضة.

اذن الخط l لايقطع الخط m.

تعريف : الزاوية التي تكون مجاورة ومكملة لزاوية من مثلث تدعى زاوية خارجية للمثلث .
زوايا المثلث غير المجاورة لزاوية خارجية تدعى زوايا داخلية مقابلة للزاوية الخارجية. زاوية خارجية لمثلث غير مجاورة لزاوية مثل $\angle A$ في المثلث تدعى زاوية خارجية مقابلة الى $\angle A$.

مبرهنة ٧٥: (مبرهنة الزوايا الخارجية)

أي زاوية داخلية لمثلث تكون اصغر من أي زاوية خارجية مقابلة لها.
البرهان:

ليكن ABC مثلثا , و D نقطة بحيث ان $A-B-D$, فان $\angle CBD$ تكون زاوية خارجية للمثلث ABC . يجب ان نبرهن ان $\angle BCA < \angle CBD$ و $\angle BAC < \angle CBD$.
اذا لم تكن $\angle BCA < \angle CBD$, فمن Th62 اما $\angle BCA \cong \angle CBD$ او $\angle CBD < \angle BCA$.

١- اذا كانت $\angle BCA \cong \angle CBD$, ولكن هذا يناقض Th72 .
٢- نفرض ان $\angle CBD < \angle BCA$: من تعريف ؟ يوجد شعاع CE في داخل $\angle BCA$ بحيث ان $\angle ECB \cong \angle CBD$ ومن Th 44 : يقطع الشعاع الضلع $A-B$ في نقطة E . فيكون في المثلث $\angle BCE \cong \angle CBD$ وهذا تناقض مع ١- .

لذا فان $\angle BCA < \angle CBD$.
لتكن F نقطة بحيث ان $C-B-F$ ومن نتيجة ٢ و Th58 , يكون $\angle ABF \cong \angle CBD$.
ومن البرهان اعلاه , يكون $\angle BAC < \angle ABF$, ومن Th 64 : يكون $\angle BAC < \angle CBD$.

مبرهنة ٧٦: (S.A.A)

اذا كانت زاويتان وضلع غير مشترك بينهما من مثلث تطابق على التوالي زاويتين وضلعا غير مشتركين من مثلث اخر , فان المثلثين يتطابقان.

البرهان:

ليكن ABC, DEF مثلثين , وفيهما:

$\angle C \cong \angle F$ و $\angle B \cong \angle E$, $A-B \cong D-E$. يجب ان نبرهن ان $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ اذا كان $B-C \cong E-F$, فانه من ASA او SAS يتطابق المثلثين.

نفرض ان $B-C$ لا تطابق $E-F$. من Th53 اما $B-C < E-F$, $E-F < B-C$.

نفرض ان $E-F < B-C$, فانه توجد نقطة H بحيث ان $B-H-C$ و $E-F \cong B-H$.
من SAS , $\triangle ABH \cong \triangle DEF$. لذلك , $\angle BHA \cong \angle EFD$, لكن $\angle BCA = \angle HCA \cong \angle EFD$ وبذلك في المثلث AHC الزاوية الخارجية $\angle BHA$ تطابق الزاوية الداخلية المقابلة لها $\angle BCA$ وهذا خلاف Th75 .

نستنتج ان $B-C \cong E-F$ ومن SAS يتطابق المثلثين.

نأخذ أي نموذج لاتساق المستوى الاسقاطي ومن ضمنها نظام فانو، ففي تلك النماذج (اي مستقيمين يتقاطعان، لذلك لا توجد خطوط متوازية).

$\sim Ax4$ + البديهيات الاخرى تحقق الاتساق.

متحققه $Ax1$

= $Ax2$

= $Ax3$

مثال: فيما يلي اختار نماذج مبينا استقلال كل بدئية في المستوى الاسقاطي.

(أ) $l = \{1,2,3,4\}$

(ب) $n = \{1,3,4\}, m = \{1,2,3\}, k = \{1,2,4\}, s = \{2,3,4\}$

(ج) $l = \{1,2,3\}, m = \{4,5,6\}$

(د) $\begin{matrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 2 & \end{matrix}$

يجب أن نلاحظ قبل الحل إن النظام وبديهياته متسق.

الحل: (ب) تحقق $\sim Ax1$ + $(Ax2, Ax3, Ax4)$ (تحقق الاتساق أيضا)

(د) تحقق $\sim Ax2$ + $(Ax1, Ax3, Ax4)$ (تحقق الاتساق أيضا)

(ج) تحقق $\sim Ax4$ + $(Ax1, Ax2, Ax3)$ (تحقق الاتساق أيضا)

(أ) تحقق $\sim Ax3$ + $(Ax1, Ax2, Ax4)$ (تحقق الاتساق أيضا)

ملاحظة: الاستقلالية خاصة غير أساسية، حيث إذا وجدت إحدى البديهيات غير مستقلة، (أي إنها مبرهنة)، توضع في مجموعة المبرهنات.

س// لاحظ النظام البديهي التالي:

البديهيات:

(١) أي مستقيمين مختلفين يتقاطعان في نقطة واحدة فقط.

(٢) كل نقطة يمر بها مستقيمان فقط.

(٣) توجد بالضبط أربعة مستقيمات في هذا النظام.



أولاً: بين إن النظام متسق.
ثانياً: حاول إيجاد نماذج لاستقلال كل بديهية في هذا النظام.

ثالثاً: الكمال أو التمام (completeness)
يقال عن النظام البديهي S انه غير تام إذا أمكن إضافة بديهية مستقلة أخرى للنظام مع إبقاء النظام متسق.

تعريف :

يكون النظام البديهي تاماً إذا استحالة إضافة بديهية مستقلة للنظام.
التشاكل: isomorphism

ليكن $f: A \rightarrow B$ تطبيق f يقال عن f تشاكل إذا حقق الشروط التالية

$$f \text{ is } 1-1 \quad (1)$$

$$f \text{ is onto} \quad (2)$$

$$f \text{ يحفظ العلاقة اي } (x \in I \rightarrow f(x) \in f(I)) \quad (3)$$

تعريف : يقال عن نموذجين لنظام بديهي انهما متشاكلين تقابلياً (isomorphic) بالنسبة لذلك النظام اذا وجد على الاقل تقابل احادي واحد بين عناصر النظام بحيث يحفظ العلاقات.

مثال:

ليكن $M1, M2$ نموذجين لنظام معين يحتويان على عدد متساو من العناصر . ان كل عنصر في $M1$ يقابل عنصراً معيناً في $M2$ وبالعكس ، في هذه الحالة ، يقال انه يوجد تناظر متباين (تقابل - احادي) بين $M1, M2$ يقال عن التقابل الاحادي بين عناصر $M1, M2$ انه يحفظ العلاقات (preserve relations) اذا كانت كل عبارة صحيحة حول عناصر $M1$ هي ايضاً صحيحة حول العناصر المقابلة لها في $M2$.

تعريف:

عندما يكون أي نموذجين في النظام البديهي متشاكلين تقابلياً ، فان النظام يقال انه فصيلي (categorical) .

طريقة اختبار التمامية: (مبرهنة)

لكي نثبت ان النظام البديهي تاماً ، يجب ان نبرهن ان النظام فصيلي (بتعبير اخر عندما يكون أي نموذجين في النظام متشاكلين تقابلياً ، فان النظام يكون تاماً).



البرهان :

نفرض ان انظام البديهي $S=\{A1,A2,\dots,A_{n-1}\}$ المتسق هو نظام فصيلي ، لكنه غير تام (أي يمكن اضافة بديهية مستقلة للنظام ولتكن A_n) ، فان :
(١) المجموعة $S1=\{A1,A2,\dots,A_n\}$ تكون متسقة.
(٢) المجموعة $S2=\{A1,A2,\dots,\sim A_n\}$ تكون متسقة لذلك، فانه يوجد نموذجان للمجموعتين (١) و(٢) .

بما ان النظام فصيلي
اذن يوجد تشاكل تقابلي بين هذين النموذجين .
ميزة التشاكل انه يحفظ العلاقات
اذن كل عبارة في نموذج مع العبارة المناظرة لها في النموذج الاخر ، اما كل منهما صائبة او كل منهما خاطئة . وهذا تناقض ، حيث انه من الفرض A_n تكون صائبة في نموذج و $\sim A_n$ صائبة في النموذج الاخر!
اذن النظام تام.

مثال: اثبت ان النظام التالي هو نظام تام

الحل: نأخذ النموذجين التاليين في المستوي التالي:

النموذج الاول (٩ نقاط ، ١٢ خط او مستقيم)

k1	k2	k3	k4	k5	k6	k7	k8	k9	k10	k11	k12
A	D	G	A	B	C	A	B	C	A	B	C
B	E	H	D	E	F	E	F	D	F	D	E
C	F	I	G	H	I	I	G	H	H	I	G

النموذج الثاني (٩ نقاط ، ١٢ خط او مستقيم)

k*1	k*2	k*3	k*4	k*5	k*6	k*7	k*8	k*9	k*10	k*11	k*12
1	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	6
2	3	5	7	3	5	7	4	5	5	7	8
4	6	8	9	9	6	8	8	7	9	6	9

لوضع تقابل احادي بين النموذجين ، نأخذ التقابل التالي:

A=1
B=2
C=3
D=4
E=5
F=6
G=7
H=8
I=9

هذا التقابل يجب ان يحفظ العلاقة ، فمثلا بما ان A,B,C تقع على المستقيم k1 ، يجب ان نتأكد من وجود مستقيم في النموذج (٢) يحتوي على العناصر المقابلة لهذه النقاط ، أي يوجد مستقيم يحتوي على النقاط 1,2,3 لكن لا يوجد مثل هذا المستقيم في نموذج رقم (٢) .
اذن التقابل لا يحفظ العلاقات.
أي ان :



مثال : نغرض ان مايلي ، هو نموذج لمستوي تافه:

<i>l</i>	<i>k</i>	<i>j</i>	<i>i</i>	<i>h</i>	<i>g</i>	<i>f</i>	<i>e</i>	<i>d</i>	<i>c</i>	<i>b</i>	<i>a</i>
5	4	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1
6	7	6	5	4	7	5	4	8	6	4	2
9	8	8	7	9	9	8	6	9	7	5	3

جد تقابل احادي يحفظ العلاقات بينه وبين النموذج التالي:

<i>l*</i>	<i>k*</i>	<i>j*</i>	<i>i*</i>	<i>h*</i>	<i>g*</i>	<i>f*</i>	<i>e*</i>	<i>d*</i>	<i>c*</i>	<i>b*</i>	<i>a*</i>
6	4	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1
8	7	5	5	4	7	5	3	7	5	3	2
9	6	9	7	8	8	6	9	9	8	6	4

الحل:

$$1 \leftrightarrow 1$$

$$2 \leftrightarrow 2$$

$$3 \leftrightarrow 4$$

$$4 \leftrightarrow 3$$

$$5 \leftrightarrow 6$$

$$6 \leftrightarrow 9$$

$$7 \leftrightarrow 7$$

$$8 \leftrightarrow 5$$

$$9 \leftrightarrow 8$$

وبالتالي:

$$i \leftrightarrow k^*$$

$$j \leftrightarrow j^*$$

$$k \leftrightarrow i^*$$

$$l \leftrightarrow l^*$$

$$e \leftrightarrow e^*$$

$$f \leftrightarrow f^*$$

$$g \leftrightarrow g^*$$

$$h \leftrightarrow h^*$$

$$a \leftrightarrow a^*$$

$$b \leftrightarrow b^*$$

$$c \leftrightarrow d^*$$

$$d \leftrightarrow c^*$$



س// جد تقابل احادي بين النموذجين التاليين:
(١) نموذج يتكون من 7 نقاط و 7 مستقيم.
(٢) نموذج يتكون من 13 نقطة و 13 مستقيم .

علما بان النموذجين بالمستوي الاسقاطي.

ملاحظة: نظامي يونك وفانو يكونان تامين ؟
ج) لانهما يتحققان فقط بالنموذج المكون من 9 نقاط، 12 مستقيم و النموذج المكون من 7 نقاط ، 7 مستقيم على التوالي. حيث أي نموذجين في نظام يونك او فانو يحتويان على نفس العناصر ولكن برموز مختلفة لنفس العناصر.



الفصل الثالث نقد اقليدس

- نقدم في هذا الفصل التعاريف والبيديهيات التي ذكرها اقليدس في كتابه "الاصول" والتي استنتج منها مبرهناته.
- سنعطي دراسة انتقادية للنظام البدهي لاقليدس "الهندسة المستوية الاقليدية".
- العيوب في طرق براهين اقليدس لمبرهناته , و طرق تحسينها.
- سنذكر النواقص من البيديهيات التي استخدمت بدون ان يذكر أي نص لها.

اعطى اقليدس "ثلاثة وعشرين" تعريفا , "عشر" فرضيات و "ثمان واربعين" مبرهنات مع براهينها.

التعاريف:

- ✚ النقطة هي التي ليست لها ابعاد.
- ✚ المستقيم هو طول بدون عرض.
- ✚ نهايات المستقيم هي نقاط.
- ✚ الخط المستقيم هو الخط الذي يقع كليا على نقاطه.
- ✚ السطح هو الذي له طول وعرض فقط.
- ✚ نهايات السطح هي خطوط.
- ✚ السطح المستوي هو ذلك السطح الذي يقع كليا على مستقيماته.
- ✚ حدود الشيء اطرافه.
- ✚ الزاوية الحادة هي الزاوية التي تكون اصغر من قائمة.
- ✚ الدائرة: هي شكل مستوي محاط بخط , بحيث ان كل اجزاء المستقيمات الواقعة على الخط من نقطة واحدة مشتركة داخل الشكل , تكون متساوية فيما بينها.
- ✚ الخطوط المستقيمة المتوازية هي الخطوط المستقيمة التي تقع في مستوي واحد والتي لا تلتقي مهما امتدت في أي الاتجاهين.

♣️ الفرضيات:

قسم اقليدس الفرضيات الى مجموعتين سمي المجموعة الاولى " مفاهيم عامة " والمجموعة الثانية " البديهيات " او " الفرضيات".

♣️ مفاهيم عامة Common Notions

- ❖ الاشياء المساوية لشيء واحد متساوية فيما بينها.
- ❖ اذا اضيفت كميات متساوية الى اخرى متساوية تكون النتائج متساوية.
- ❖ اذا طرحنا كميات متساوية من اخرى متساوية تكون النتائج متساوية.
- ❖ الاشياء المتطابقة متساوية فيما بينها.
- ❖ الكل اكبر من الجزء.

♣️ البديهيات Postulates

- ١) من الممكن رسم خط مستقيم من أي نقطة الى أي نقطة.
- ٢) يمكن مد قطعة المستقيم من جهتيها الى غير حد.
- ٣) يمكن رسم دائرة اذا علم مركزها ونصف قطرها.
- ٤) جميع الزوايا القوائم متساوية.
- ٥) اذا قطع مستقيمان بمستقيم ثالث بحيث كان مجموع الزاويتين الداخليتين الواقعتين على جهة واحدة من القاطع اقل من قائمتين , فان المستقيمين , اذا مدا بغير حد , يتلاقيا في تلك الجهة من القاطع التي يكون فيها مجموع الزاويتين اقل من قائمتين.

♣️ ملاحظة


تعتبر البديهية الخامسة نقطة البداية في دراسة الهندسة اللاقليدية , حيث نجد ان اقليدس برهن اول ٢٨ مبرهنة دون ان يستعمل البديهية الخامسة , مما اثار انتباه العلماء الذين اتوا بعد اقليدس , مما جعل قسما منهم يعتقد ان البديهية الخامسة يجب ان تكون مبرهنة ولذا يجب ان تبرهن.

♣️ المبرهنات:

- كيفية رسم مثلث متساوي الاضلاع على مستقيم معلوم ومنته في الطول.
- كيفية رسم مستقيم من نقطة معلومة طوله يساوي طول مستقيم معلوم.
- من اكبر مستقيمين معلومين كيفية قطع جزء يساوي اصغر المستقيمين.
- اذا تساوى ضلعان والزاوية المحصورة بينهما من مثلث ضلعين والزاوية المحصورة بينهما من مثلث اخر , على التناظر , فانه يتساوى المثلثان وتتساوى الزوايا المتناظرة والضلع من احدهما نظيره من الاخر.

٤. اعتمد على الرسم لبرهان مبرهناته وليس مجرد توضيح البرهان.
٥. ان بديهيات اقليدس ليست كاملة . أي اننا نستطيع اضافة بديهيات جديدة الى بديهيات اقليدس . والدليل على ان مجموعة بديهيات اقليدس غير كاملة العبارة التالية : "الخط الذي يصل بين نقطة داخل دائرة ونقطة خارجها يقطع الدائرة". هذه العبارة لا يمكن برهنتها او حضنها . والسبب الاساسي هو عدم اعطاء بديهية الاستمرارية.

بعض مبرهنات اقليدس



مبرهنة ١ :

كيفية رسم مثلث متساوي الاضلاع على مستقيم معلوم ومنته في الطول .
بتعبير اخر : لاي قطعة يوجد مثلث متساوي الاضلاع له القطعة كضلع.
العمل والبرهان :

لتكن AB قطعة .

من بديهية ٣ : توجد دائرة مركزها A ونصف قطرها AB , وكذلك توجد دائرة مركزها B ونصف قطرها AB

تتقاطع الدائرتين في نقطة وتكون C .

من بديهية ١ : توجد القطعتان BC و AC .

من تعريف الدائرة : $BC=AB$ و $AC=AB$

لذلك $AB=BC=AC$

وبهذا يكون المثلث ABC متساوي الاضلاع .

النقد الموجه لاقليدس في برهان هذه المبرهنة , بعبارة ادق (خطأ اقليدس في البرهان)

- لم يبين اقليدس ان النقطة C موجودة , حيث انه لا توجد بديهية عن تقاطع دائرتين , وحتى لو فرضنا وجود النقطة C , فمن المحتمل وقوعها على المستقيم AB , وبهذه الحالة لا يوجد المثلث ABC .
- من بديهية رقم ١ : لكل نقطتين مختلفتين , توجد قطعة مستقيم تصل بينهما , لم يذكر اقليدس شيئا عن وحدانية القطعة .

▪ ثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة تكون مثلثا واحدا فقط (هذا لا يمكن برهانه من بديهيات اقليدس).

مبرهنة ٢ :

كيفية رسم مستقيم من نقطة معلومة طوله يساوي طول مستقيم معلوم.
العمل والبرهان:

لتكن A نقطة معلومة و BC مستقيما معلوما .

م. رسم مستقيم يمر من A طوله يساوي المستقيم BC .

من بديهية ١ : يوجد مستقيم AB بين النقطتين A و B .

من مبرهنة ١ : يرسم مثلث متساوي الاضلاع DAB .

من بديهية ٢ : تم قطع المستقيم AD الى نقطة E وكذلك قطعة المستقيم BD الى نقطة F .

من بديهية ٣ : يرسم دائرة مركزها B ونصف قطرها BC ولتكن الـ دائرة HGC و K ذلك

يرسم دائرة مركزها D ونصف قطرها DG ولتكن GKL .

بما ان B مركز الدائرة HGC , فان $BC=BG$.

بما ان D مركز الدائرة GKL , فان $DG=DL$.

بما ان $DB=DA$, فان $AL=BG$ (مفاهيم عامة - ٣) .

وبما ان $BC=BG$, فان $AL=BG=BC$ (مفاهيم عامة - ١) .

أي ان $AL=BC$.

لذلك , من نقطة معلومة A , رسم خطا مستقيما AL طوله يساوي طول مستقيم معلوم .

الخطأ او الخلل في البرهان:

▪ كل العبارات في البرهان نتجت من بديهيات اقليدس , مفاهيم عامة , تعاريف ,

مبرهنة ١. الخلل لا يقع في العبارات التي استخدمت ولكن استخدمت فرضيات غير

مذكورة. مثلا " الخط الذي يمر بنقطة داخل دائرة , يجب ان يقطع الـ دائرة " .

استخدمها اقليدس كفرضية مخفية وضحت بالرسم .

مبرهنة ٤ :

اذا تساوى ضلعان والزاوية المحصورة بينهما من مثلث ضلعين والزاوية المحصورة

بينهما من مثلث اخر , على التناظر , فانه يتساوى المثلثان و تتساوى الزوايا المتناظرة

والضلع من احدهما نظيره من الاخر .


المفروض: $\triangle ABC, \triangle DEF$ فيهما

, $AB=DE, AC=DF, \angle A = \angle D$.

$$\triangle ABC \cong \triangle DEF . م .$$

البرهان:

نضع المثلث ABC على المثلث DEF بحيث ان الرأس A يقع على الرأس D , الضلع AB ينطبق على الضلع DE .



بما ان $AB=DE$, فان النقطة B تقع على E .

بما ان $\angle A = \angle D$, فان الضلع AC يقع على الضلع DF .

وبما ان $AC=DF$, فان الرأس C يقع على الرأس F , لذلك , فان

$$\angle C = \angle F, \angle B = \angle E , BC=EF$$


الخطأ في البرهان :

▪ استعمل اقليدس في برهانه طريقة نقل الاشكال كطريقة للبرهان . ولكن تحريك مثلث غير ممكن فيزيائيا (اذ لا يمكن بقاء الاشكال على حالها بدون تغيير) .

مبرهنة ٥:

في المثلث المتساوي الساقين تتساوى زوايا القاعدة واذا مد الضلعان المتساويان فالزاويتان الواقعتان تحت القاعدة تتساويان ايضا .

البرهان:



ليكن ABC مثلث , وفيه $AB=AC$.

م . اثبات ان $\angle C = \angle B$.

من نقطة A نرسم منتصف يقطع الضلع BC في نقطة D .

من مبرهنة ٤ : يتساوى $\triangle ABD$ و $\triangle ADC$, لذا تتساوى $\angle B$ و $\angle C$.

الخطأ في البرهان :

▪ فرض اقليدس ان المنصف لزاوية موجود ويكون وحيدا .

▪ فرض ايضا ان منصف زاوية او (المستقيم المرسوم) من احد رؤوس المثلث يقطع الضلع المقابل .


مبرهنة ٦:

اذا تساوت زاويتان في مثلث , فالضلعان المقابلان لهما متساويان .

البرهان:

ليكن ABC مثلث , وفيه $\angle ABC = \angle ACB$.

م . $AB=AC$.



لو نفرض ان $AB \neq AC$

فان احدهما اكبر من الاخر , ليكن $AB > AC$.

نختار النقطة D على الخط AB بحيث ان $BD = AC$.

حسب بديهية ١ : يوجد المستقيم DC .

بما ان $AC = DB$ و BC مشترك $\triangle ABC$ و $\triangle DCB$.

$$\angle ACB = \angle DCB$$

من مبرهنة ٤ : $AB = DC$, و $\triangle ABC = \triangle DCB$.

أي نحصل على ان المثلث الاكبر يساوي الاصغر , تناقض .

اذن $AB = AC$.


الخطأ في البرهان:

▪ البرهان تم عن طريق التناقض . ولكنه لم يحدد اين التناقض بالضبط ؟ اسد تنتج ان

المثلث الاكبر يساوي الاصغر , ولم يشر الى المساحة بل اعتمد على الرسم .

تعريف الزاوية: " ميلان احد مستقيمين متقاطعين عن الاخر ."

ملاحظة: لم يعطي اقليدس معنى الميلان للمستقيم .



مبرهنة ٩:

كيفية تصنيف زاوية.

العمل والبرهان:

لتكن زاوية BAC و D نقطة تقع على الضلع AB .

من مبرهنة ٣ (من اكبر مستقيمين معلومين كيفية قطع جزء يساوي اصغر المستقيمين):

توجد نقطة E على الضلع AC بحيث ان $AD = AE$.

من مبرهنة ١ : يوجد مثلث متساوي الاضلاع EDF .

في $\triangle ADF$ و $\triangle AEF$ ($AE = AD$, $EF = DF$ و AF مشترك),

AF ينصف $\angle BAC$ (من مبرهنة ٨ " اذا ساوى ضلعان في مثلث ضلعي اخر على التوالي


وتساوت قاعدتهما تساوت زواياهما على التناظر") , يتساوى $\triangle ADF$ و $\triangle AEF$,

$$\text{وبذلك , فان } \angle FAD = \angle FAE$$

$$\text{وهذا يؤدي الى ان } \angle BAF = \angle CAF$$

الخطأ في البرهان:

▪ اعتمد اقليدس في هذا البرهان على الرسم , اذ كيف برهن ان AF يقع في داخل الزاوية.



مبرهنة ١٠ :

كيفية تنصيف قطعة.

العمل والبرهان:

لتكن AB قطعة مستقيم .

من مبرهنة ١ : يوجد مثلث متساوي الاضلاع ABC .

من مبرهنة ٩ : تنصف الزاوية ACB .

لتكن D نقطة تقاطع هذا المنصف مع الضلع AB .

من مبرهنة ٤ : يتساوى $\triangle ACD$ و $\triangle BCD$,

من ذلك نستنتج ان $AD = DB$.

الخطأ في البرهان:

▪ افترض ان المنصف للزاوية يقطع الضلع المقابل في نقطة D من المحتمل ان تكون غير موجودة (بدون برهان).

▪ استخدم مفهوم البينية (نقطة بين نقطتين) بدون ان يتطرق اليه.

مبرهنة ١٦ :

اذا مد احد اضلاع مثلث فالزاوية الخارجية تكون اكبر من أي من الزاويتين الداخليتين المقابلتين لها.

البرهان:

ليكن ABC مثلث , وليكن احد اضلاعه BC يمد الى D .

م. يجب برهان ان الزاوية الخارجية ACD اكبر من أي الزاويتين الداخليتين المقابلتين لها .

ABC و BAC .


لتكن E منتصف AC (كما في الرسم) .

بعد ائصال BE يمد بخط مستقيم الى F بحيث ان $BE = EF$,

من بديهية ١ : نصل C و F ,

من بديهية ٢ : نمد AC الى G .

بما ان $BE = EF$, $AE = EC$ و $\angle AEB = \angle FEC$ (زاويتان راسيتان)



لذلك $\triangle AEB = \triangle CEF$ و $AB = CF$,

والزاويتان الباقيتان للمثلث AEB تساويان الزاويتين الباقيتين , على التوالي , للمثلث CEF .

لذلك $\angle BAE = \angle ECF$

لكن $\angle ECD > \angle ECF$, لذلك $\angle ACD > \angle BAE$

بنفس الطريقة , اذا نصف BC , $\angle BCG = \angle ACD$,

يمكن ان يبرهن : $\angle BCG > \angle ABC$.

الخطأ في البرهان:

- مد قطعة المستقيم من جهتيها بغير حد , لا يؤدي الى ان طول المستقيم غير منته .
- استعمل اقليدس مصطلحات غير محدود كمفهوم الامتداد , بينما غير محدود تتسجم مع المستقيم المنته في الطول والغير منته .
- كيف عرف اقليدس ان F تقع في داخل $\angle ACD$ ومنه استنتج ان $\angle ACF < \angle ACD$
- اهمال مفهوم البينية (نقطة بين نقطتين اخريتين, شعاع بين شعاعين اخريين , الذي من خلاله نعرف زاوية اصغر من اخرى).
- لم يعرف مفاهيم مثل داخل أو خارج , جهة مستقيم.

نتيجة:

كل المثلثات تكون متساوية الساقين .

البرهان: H.W

بديهية ديديكاتيد :

اذا وقعت كل نقاط مستقيم في صنفين بحيث ان كل نقطة من الصنف الاول تقع على يسار كل نقطة من الصنف الثاني , فعندئذ توجد نقطة واحدة فقط تفصل بين الصنفين وتقسّم المسد تقسيم الى صنفين .

استخدم اقليدس هذه البديهية في برهان التالي:

ميرهنة:

المستقيم الواصل بين نقطة داخل دائرة ونقطة خارجها له نقطة مشتركة مع الدائرة .


البرهان:

ليكن D مركز الدائرة ,

r نصف قطرها ,

A نقطة داخل الدائرة ,

B نقطة خارجها .



يكون $AD < r < BD$

نرسم DC عموديا على AB او امتداده.

فيكون $CD < AD < r$.

نقسم نقاط AB الى صنفين :

الاول مجموعة النقاط X التي تحقق $XD < r$.

الثاني مجموعة النقاط Y التي تحقق $YD \geq r$.

لذلك , $XD < YD$,

وبالتالي نحصل على $CX < CY$.

لذا فان كل نقطة X تسبق كل نقطة Y ,

من بديهية ديديكانيه : توجد نقطة E من القطعة AB بحيث ان كل النقاط التي تسبق E تنتمي

الى صنف واحد وكل النقاط التي تتبع E تنتمي الى صنف اخر.

اذن يجب ان نبرهن ان E تقع على محيط الدائرة.

اذا لم تكن E على محيط الدائرة , فاما تكون داخل الدائرة او خارجها .

نفرض ان E داخل الدائرة:

. $ED < r$

نختار نقطة F , بحيث $F \in AB$ و

1..... $EF < r - DE$

في $\triangle DEF$

2..... $DF < DE + EF$

من 1 و 2 نحصل :

$DF < r$, وبهذا فان F تقع في داخل الدائرة الى يسار E , تناقض (لان F تقع على يمين E

وتتصف بخاصية النقاط التي تقع الى يسار E , أي انه تقع F داخل الدائرة و $DF > DE$).

لذلك لايمكن ان تقع E داخل الدائرة (E لاتفصل بين الصنفين).

نفرض ان E خارج الدائرة: (في الرسم اعلاه تكون E')

. $DE' > r$

نفرض وجود F' , بحيث $F' \in AB$ وكذلك F' بين A و E' بحيث ,

3..... $E'F' < DE' - r$

في $\triangle DE'F'$

4..... $DF' + F'E' > DE'$

من 3 و 4 نحصل:

$DF' > r$, تتاقض (لانه وجدنا نقطة الى يسار E' وتتصف بخواص النقطة الواقعة على المستقيم AB الى يمين E' , أي ان E' غير فاصلة للصنفين او المجموعتين).
لذلك يجب ان تقع E على محيط الدائرة.

أسس الهندسة

من الفصل الرابع يبدأ تقويم الهندسة الاقليدية وينتهي بالفصل السابع ، حيث سنطرح نظام هلبرت للهندسة الاقليدية نسبة الى العالم الالماني دافيد هلبرت (١٨٦٢-١٩٤٣) حيث قدم نظاما بدهيا متكاملما الذي استنتج منه الهندسة الاقليدية . لقد صحح الاخطاء والعيوب التي رافقت اعمال اقليدس .

يتالف النظام من مجموعتين من البديهيات.

اولا : بديهيات الوقوع والوجود

AX1 : لكل نقطتين مختلفتين معلومتين ، يوجد مستقيم واحد فقط يحتويهما.

AX2 : كل مستقيم يحتوي على نقطتين في الاقل.

AX3 : لكل مستقيم معلوم ، توجد في الاقل نقطة واحدة لاتنتمي اليه .

AX4 : يوجد في الاقل مستقيم واحد.

تعريف : تكون المجموعتان متساويتين اذا فقط اذا احتوتا بالضبط على نفس العناصر.

مبرهنة ١ :

توجد في الاقل ثلاث نقاط في النظام .

البرهان:

حسب AX4 : يوجد l مستقيم .

حسب AX3 : توجد $P \notin l$.

حسب AX2 : l يحتوي على نقطتين مختلفتين A, B .

اذن توجد على الاقل ثلاث نقاط مختلفة.

ملاحظة مهمة: يرمز للنقاط باحرف كبيرة A, B, C, \dots وللمستقيمات يرمز لها باحرف صغيرة l, m, n, \dots .

مبرهنة ٢ :

أي مستقيمين مختلفين يشتركان في نقطة واحدة على الاكثر.

البرهان:

نفرض ان l, m مستقيمين مختلفين ، أي ان $l \neq m$.

ولتكن A, B نقطتين بحيث ان $A, B \in (l, m)$.

من Ax1 : نحصل على ان $l = m$ ، تناقض مع الفرض.

ثانيا : بديهيات الترتيب Axioms of order

ان بديهيات الوقوع والوجود ليست كافية لاشتقاق بعض المبرهنات المعروفة في الهندسة الاقليدية وليست كافية لوجود اكثر من نقطتين على خط ولا وجود عدد غير منته من النقاط على الخط، ولا تضمن وجود عدد غير منته من النقاط بين أي نقطتين ، ولا يمكن ان تكلم عن نقطة بين نقطتين ، ولا يمكن ان نتكلم عن قطعة مستقيم او المقارنة بين القطع فايهما الاكبر او الاصغر . كل هذا يأتي من العلاقة "بين" . فقد اهمل اقليدس هذه العلاقة في بديهياته ولكنه استنتجها من الرسم ، وهذا لايعني اننا لانستخدم الرسم ، غير ان لا يكون جزءا من البرهان.

ملاحظة :

"بين" هي كلمة اولية تقنية . الرمز $A-B-C$ يعني ان " B تقع بين A و C " .

البديهيات

$A-B-C \iff C-B-A$: Ax5

Ax6 : اذا كان $A-B-C$ ، فان النقاط A, B, C مختلفة وتقع على مستقيم واحد.

Ax7 : اذا كانت A, B, C أي ثلاث نقاط مختلفة وتقع على مستقيم واحد ، فان واحدة

مما يلي تتحقق :

$A-B-C$ ، $B-C-A$ ، $C-A-B$

ملاحظة:

الرمز A-B-C-D هو مختصر الى A-B-C, A-B-D و B-C-D, A-C-D .

وبنفس الطريقة بالنسبة لاكثر من اربع نقاط .

Ax8 : اذا كانت A,B,C,D اربع نقاط مختلفة وعلى مستقيم واحد وان A-B-C فان واحدة فقط مما يلي تتحقق: A-B-C-D, A-B-D-C, A-D-B-C, D-A-B-C

Ax9 : اذا كانت A, B أي نقطتين ، فان :

١. توجد نقطة C بحيث ان A-B-C .
٢. توجد نقطة D بحيث ان A-D-B .
٣. توجد نقطة E بحيث ان E-A-B .

مبرهنة ٣:

١- اذا كان A-B-C و A-C-D فان النقاط A,B,C,D مختلفة وعلى مستقيم واحد .

٢- اذا كان A-B-D و B-C-D ، فان النقاط A,B,C,D مختلفة وعلى مستقيم واحد.

٣- اذا كان A-B-C و B-C-D ، فان النقاط A,B,C, D مختلفة وعلى مستقيم واحد.

البرهان :

برهان ١-

من Ax6 : بما ان A-B-C ، فان النقاط A,B,C مختلفة وعلى مستقيم واحد. وكذلك بما ان A-C-D ، فان النقاط A,C,D مختلفة وعلى مستقيم واحد .

يجب ان نبرهن ان $B \neq D$

اذا كان $B=D$: فانه بتعويض ذلك في A-C-D \leftarrow A-C-B ، ولكن من الفرض A-B-C ، تناقض مع Ax7 .

لذلك ، فان النقاط A,B,C,D تكون مختلفة .

من Ax1 : يوجد مستقيم واحد فقط يتعين من A و C .

بما ان B و D تقعان على المستقيم AC ، فان A,B,C,D تقع على مستقيم واحد.

برهان ٢- H.W

برهان ٣- H.W

مبرهنة ٤ :

١- اذا كان A-B-C و A-C-D ، فان A-B-C-D .

٢- اذا كان A-B-D و B-C-D ، فان A-B-C-D .

٣- اذا كان A-B-C و B-C-D ، فان A-B-C-D .

البرهان :

برهان ١-

حسب 3 Th : A-B-C و A-C-D ← A, B, C, D مختلفة وعلى استقامة واحدة . بما ان A-B-C

حسب Ax8 : تتحقق واحدة فقط مما يلي

. A-B-C-D , A-B-D-C , A-D-B-C , D-A-B-C

بما ان A-C-D ، حسب Ax7 : لا تتحقق كل من

A-D-C

D-A-C

من هذا نستنتج انه لا تتحقق كل من الحالات الاتية:

A-D-B-C , D-A-B-C , A-B-D-C لذلك تتحقق الحالة الوحيدة،

. A-B-C-D

برهان ٢- H.W

برهان ٣- H.W

مبرهنة ٥ :

١- اذا كان A-B-D و A-C-D و $B \neq C$ ، فان A-B-C او A-C-B .

٢- اذا كان A-B-C و A-B-D و $C \neq D$ ، فان B-C-D او B-D-C .

٣- اذا كان A-B-C و A-B-D و $C \neq D$ ، فان A-C-D او A-D-C .

البرهان :

برهان ١-

من الفرض $A-B-D$ وحسب $Ax6$: $A-B-D$ مختلفة وتقع على مستقيم واحد .
ومن الفرض ايضا $A-C-D$ وحسب $Ax6$: $A-C-D$ مختلفة وتقع على مستقيم واحد.

ولكن $B \neq C$ بالفرض

اذن النقاط A, B, C, D مختلفة .

حسب $Ax1$: يوجد مستقيم يحتوي النقطتين A, D

بما ان النقاط A, B, D تقع على مستقيم واحد ومختلفة أي ان B تقع على AD ،
وكذلك ، بما ان A, C, D تقع على مستقيم واحد ومختلفة أي ان C تقع على AD .

اذن النقاط A, B, C, D مختلفة وتقع على مستقيم واحد.

بما ان $A-B-D$ وحسب $Ax8$: تتحقق واحدة فقط من الحالات

. $A-B-C-D$, $A-B-D-C$, $A-C-B-D$, $C-A-B-D$.

ولكن بالفرض $A-C-D$ ،

اذن اما $A-B-C-D$ ← $A-B-C$

او $A-C-B-D$ ← $A-C-B$.

برهان ٢- H.W

برهان ٣- H.W

مبرهنة 16:

أي نقطة R في القطعة $A-B$ تفصل $A-B$ الى مجموعتين جزئيتين غير خاليتين $R-B$ و $A-R$ اللتين مع $\{R\}$ تكون تجزئة للقطعة $A-B$.

البرهان:

واجب؟

مقدمة لبديهية باخ: The Axiom of Pasch

في كثير من البراهين الاقليدية، مثل، "المستقيم الذي يمر برأس مثلث" و "منصف زاوية في مثلث" قد افترضت بان هذه المستقيمات تقطع الضلع المقابل في المثلث. لكن على أي اساس اعتمدت هذه الفرضية؟ لقد صاغ العالم باخ بديهيته ليس فقط على انها عبارة اعتمد عليها في البراهين، ولكن لانه ليس بالامكان برهنتها من بديهيات اقليدس المعروفة.

تعريف:

لتكن A, B, C ثلاث نقاط مختلفة ولا تقع على مستقيم واحد، ان اتحاد $\{A, B, C\}$ مع القطع $A-B$ $A-C, B-C$ يدعى مثلثا، تدعى A, B, C الرؤوس. تدعى $A-C, A-B, B-C$ الاضلاع.

AX10: "باخ"

اذا كانت A, B, C رؤوس مثلث و m هو مستقيم لا يمر باي راس من هذه الرؤوس ويحتوي m على نقطة من الضلع $A-B$ ، فان m يحتوي كذلك على نقطة من الضلع $B-C$ او $A-C$.

تسال: هل ان المستقيم m يقطع كل من $B-C$ و $A-C$ ؟

الجواب / كلا. كما في مبرهنة 17.

مبرهنة 17:

اذا كانت A, B, C رؤوس مثلث، أي مستقيم m يحتوي على نقطة من الضلع $A-B$ ونقطة من الضلع $A-C$ ، فانه لا يمكن ان يحتوي على نقطة من الضلع $B-C$.

او بعبارة اخرى: المستقيم الذي يقطع ضلعا واحدا من مثلث والذي لا يمر باي راس منه، فانه يقطع ضلعا واحدا فقط من الضلعين الاخرين.

البرهان:

نفرض وجود مستقيم m يحتوي على مثل هذه النقاط D, E, F بحيث ان $D \in A-B, E \in B-C, F \in A-C$.


من الفرض ومبرهنة 2: تكون النقاط مختلفة.

ثالثاً: الخطوط ومساكنات

±

يفهم لهذا البند مسلمات الخطوط ونظائرها والزوايا والمثلثات وبعض التطبيقات
ونبأ بما يلي:

تعريف: (أ) الزاوية: هي مجموعة من النقاط الناتجة عن اتحاد شعاعين يشتركان
في نقطة واحدة وتسمى النقطة المشتركة برأس الزاوية.
ويعبر عن الزاوية المكونة من شعاعين \vec{BA} , \vec{BC} بالكتابة
 $\angle ABC$ أو $\angle CBA$ أو $\angle B$ كما في الشكل.



(ب) داخل الزاوية $\angle ABC$: هو جميع النقاط P بحيث ان اشعاع \vec{BP}
يقع بين الشعاعين \vec{BA} , \vec{BC} ، ويرمز له
بالرمز $\text{Int}(\angle ABC)$.

(ج) الزاوية المستقيمة: هي الزاوية الناتجة عن اتحاد شعاعين متقابلين
(د) الزاويتين المتتامتين: هي الزاويتين اللتان تشتركان في رأس واحد وتعاكس
الضلعان الاخران.

(هـ) الزاوية القائمة: هي الزاوية التي تتطابق مع مقياسها، واذا امسك $\angle ABC$ قائم
فصل ان الضلع AB محو على BC ويرمز له $B \perp BC$

تعريف :

التجزئة (Partition) : لتكن S مجموعة غير خالية ، ولتكن S_1, S_2, \dots, S_n مجموعات غير خالية وجزئية من المجموعة S ، المجموعات S_1, S_2, \dots, S_n يقال او تعرف بانها تجزئة للمجموعة S اذا تحقق الاتي:

$$\bullet S = S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \dots \cup S_n = \bigcup_i S_i$$

$$\bullet S_1 \cap S_2 = \varnothing .$$

او بتعبير اخر : اذا كانت المجموعة S هي اتحاد مجموعتين (او اكثر) جزئيتين غير خاليتين A_1, A_2 بحيث ان كل عنصر في S هو عنصر في واحدة وواحدة فقط من المجموعات الجزئية ، فانه يقال ان A_1, A_2 تكونان تجزئة للمجموعة S .

مثال:

المجموعتان $\{1,2\}$ و $\{3,4,5\}$ تكونان تجزئة للمجموعة $\{1,2,3,4,5\}$.

لتكن O اية نقطة على مستقيم m و A نقطة اخرى على m . لتكن S_1 مجموعة كل النقاط على m من ضمنها A وكل النقاط X بحيث ان $O-X-A$ او $O-A-X$.

لتكن S_2 مجموعة كل النقاط Y بحيث ان $Y-O-A$. فان S_1 و S_2 تدعيان جهتي O على m . وتدعيان ايضا نصفي المستقيم m بالنسبة الى O . أي ان

$$S_1 = \{X \in m : O-X-A \vee O-A-X \vee X=A\}$$

$$S_2 = \{Y \in m : Y-O-A\} .$$

لتكن S_1 و S_2 مجموعتين مختلفتين غير خاليتين ومنفصلتين وكلا منهما منفصلة عن مجموعة اخرى S ويتحقق الشرطان التاليان :

- لاي عنصر A في S_1 و B في S_2 ، توجد نقطة في S بين A و B ،

• لاي عنصرين A و B من نفس المجموعة ، لا توجد نقطة في S بينهما ،

فاته يقال بان S تفصل (Separates) S_1 و S_2

مبرهنة ٦ :

جهتا النقطة O على المستقيم m لا تحتويان على O .

أو بمعنى اخر: $O \notin S_1 \wedge O \notin S_2$.

البرهان :

نفرض ان $O \in S_1$

$$O-O-A \vee O=A \vee O-A-O$$

ولكن $O \neq A$

$$O-A-O \vee O-O-A$$

ولكن حسب $Ax6$: A, O, O نقاط مختلفة (تناقض)

اذن O غير موجودة في S_1 .

وكذلك ، اذا كان $O \in S_2$ وحسب تعريف S_2 ،

O, O, A نقاط مختلفة (تناقض) ، اذن O غير موجودة في S_2 .

اذن O لا تنتمي الى جهتي O .

مبرهنة ٧ :

اية نقطة O على مستقيم m تفصل m الى جهتين بالنسبة الى O وتكونان مع O

تجزئة للمستقيم m .

البرهان ؟:

مبرهنة ٨ :

لتكن O, A, A' ثلاث نقاط مختلفة على مستقيم m ، جهتا النقطة O على المستقيم m المتعینتين من O و A هما نفس الجهتين المتعینتين من O و A' .

البرهان :

لتكن $S_1 \wedge S_2$ جهتي النقطة O على المستقيم m المتعینتين من O و A

$$S_1 = \{X \in m : O-X-A \vee O-A-X \vee X=A\}$$

$$S_2 = \{Y \in m : Y-O-A\}.$$

لتكن S_1^* و S_2^* جهتي النقطة O على m المتعینتين من O و A'

$$S_1^* = \{X \in m : O-X-A' \vee O-A'-X \vee X=A'\}$$

$$S_2^* = \{Y \in m : Y-O-A'\}.$$

النقاط O, A, A' مختلفة وتقع على المستقيم m .

حسب $Ax7$: تتحقق واحدة فقط ممايلي :

$$O-A-A', O-A'-A, A'-O-A$$

الحالة (١) :

نفرض ان $O-A-A'$. يجب ان نبرهن ان $S_1 = S_1^*$ و $S_2 = S_2^*$

أ- لكي نبرهن ان $S_1 = S_1^*$ يجب ان نبين ان $S_1 \subseteq S_1^*$ و $S_1^* \subseteq S_1$

$$(١) \text{ لاجل ان نبرهن } S_1 \subseteq S_1^*$$

يجب ان نبين اذا كان $X \in S_1$ ، فان $X \in S_1^*$

$$X \in S_1 \longleftarrow X=A \text{ أو } O-X-A, O-A-X$$

نفرض ان $O-X-A$

وبما ان $O-A-A'$ ،

حسب $Th4$: يكون

$$X \in S_1^* \longleftarrow O-X-A' \longleftarrow O-X-A-A'$$

نفرض O-A-X

وبما ان O-A-A' واذا كان $X \neq A'$

فان من Th5 \longleftarrow O-A'-X او \longleftarrow O-X-A' $X \in S_1^*$

اما اذا كان $X=A'$ فان $X \in S_1^*$

عندما $X=A$

وبما ان O-A-A' \longleftarrow O-X-A' $X \in S_1^*$

يتبين مما تقدم ان $S_1 \subseteq S_1^*$.

(٢) برهان $S_1^* \subseteq S_1$ نتبع نفس طريقة (١) من فرع (أ).

ب- لكي نبرهن ان $S_2 = S_2^*$ يجب ان نبين ان $S_2 \subseteq S_2^*$ و $S_2^* \subseteq S_2$

(١) يجب ان نبرهن $S_2 \subseteq S_2^*$

أي ان لكل $X \in S_2$ \longleftarrow $X \in S_2^*$.

$X \in S_2$ \longleftarrow X-O-A

وبما ان O-A-A'

ومن Th4 \longleftarrow X-O-A-A'

\longleftarrow X-O-A' $X \in S_2^*$

(٢) بنفس طريقة (١) من فرع ب-

نبرهن ان $S_2^* \subseteq S_2$.

يتبين مما تقدم ان $S_1 = S_1^*$ و $S_2 = S_2^*$

وبنفس طريقة الحالة (١) نبرهن

$S_1 = S_1^*$ و $S_2 = S_2^*$.

اذا كان O-A'-A و $S_1 = S_2^*$ و $S_2 = S_1^*$ اذا كان A'-O-A.

مبرهنة ٩ :

لتكن O و O' نقطتين مختلفتين على مستقيم m . جهتا النقطة O على المستقيم m تختلفان عن جهتي النقطة O' على m .

البرهان : ؟

تعريف قطعة المستقيم * * :
• •

لتكن A و B نقطتين مختلفتين ، مجموعة كل النقاط X بحيث ان A-X-B تدعى قطعة مستقيم ويرمز لها بالرمز A-B .

مبرهنة ١٠ :

النقطتان A و B لا تنتميان الى A-B .

البرهان:

لو افترضنا ان $A \in A-B$

وحسب تعريف قطعة المستقيم A-A-B ،

حسب Ax6 : النقاط A,A,B مختلفة وعلى مستقيم واحد .

اذن $A \neq A$ (تناقض).

اذن $A \notin A-B$.

وبنفس الطريقة $B \notin A-B$.

مبرهنة ١١ :

A-B هي مجموعة غير خالية.

البرهان:

لتكن A-B قطعة معلومة

ومن تعريف القطعة ، النقطتين A و B مختلفتين .

وحسب Ax9 : توجد نقطة C بحيث ان A-C-B .

أي ان $C \in A-B$.

وبهذا فان A-B مجموعة غير خالية.

مبرهنة ١٢ :

$A-B=B-A$

البرهان :

يجب ان نبرهن ان $A-B \subseteq B-A$ وان $B-A \subseteq A-B$.

لكي نبين ان $A-B \subseteq B-A$.

يجب ان نبرهن اذا كان $X \in A-B$ ، فان $X \in B-A$

بما ان $X \in A-B$ ، فان $A-X-B$.

ومن $Ax5$: يكون $B-X-A$.

ومن تعريف قطعة المستقيم ، $X \in B-A$.

وبنفس الطريقة ، نبرهن الاتجاه الاخر.

مبرهنة ١٣ :

$A-B$ هي مجموعة جزئية من المستقيم AB .

البرهان:

يجب ان نبرهن ان $X \in A-B$ وبالتالي فان X تقع على المستقيم AB

$A-X-B \longleftarrow X \in A-B$

ومن $Ax6$: A, X, B مختلفة وعلى مستقيم واحد.

لذا فان X تقع على المستقيم AB .

مبرهنة ١٤ :

لتكن A و B نقطتين مختلفتين ، فان $A-B=C-D$ اذا فقط اذا $\{A,B\}=\{C,D\}$.

البرهان :

نفرض ان $\{A,B\}=\{C,D\}$

اذن اما $(A=C$ و $B=D)$ او $(A=D$ و $B=C)$

اذن اما $(A-B=C-D)$ او $(A-B=D-C)$

ولكن حسب $Th12$: $C-D=D-C$

اذن اما $(A-B=C-D)$ او $(A-B=C-D)$

اذن $A-B=C-D$.

نفرض ان $A-B=C-D$

يجب ان نبرهن ان $\{A,B\}=\{C,D\}$

لو افترضنا ان $\{A, B\} \neq \{C, D\}$

اذن يوجد عنصر واحد بحيث ان $C \in \{C, D\}$ وان $C \notin \{A, B\}$

أي ان $C \neq B, C \neq A$

ولكن $A \neq B$ (حسب تعريف قطعة المستقيم).

اذن النقاط A, B, C ثلاث نقاط مختلفة ١

حسب Th13 : $A-B \subseteq AB$

$C-D \subseteq CD$

ولكن $A-B=C-D$ بالفرض

اذن $C-D \subseteq A-B$ (القطعتان $A-B$ و $C-D$ تقعان على مستقيم واحد وهو المستقيم AB).

اذن النقاط A, B, C تقع على مستقيم واحد..... ٢

من ١ و ٢ نحصل على ان النقاط A, B, C مختلفة وعلى مستقيم واحد.

وحسب Ax7 : يتحقق واحد فقط مما يلي :

.١ $A-C-B$

.٢ $C-A-B$

.٣ $A-B-C$

الحالة الاولى : عندما $A-C-B$

وحسب تعريف قطعة المستقيم $C \in A-B$

ولكن بالفرض $A-B=C-D$

اذن $C \in C-D$ وهذا يخالف Th10 : حيث ان الاطراف لا تنتمي لقطعة المستقيم

الحالة الثانية: عندما $C-A-B$

حسب Th11 : توجد نقطة H في $A-B$ بحيث ان $A-H-B$

ولكن $C-A-B$: حسب Th4 ، $C-A-H-B$

١..... $C-A-H$

ولكن $H \in A-B$ بالبرهان و $A-B=C-D$ بالفرض

اذن $H \in C-D$ ← ٢..... $C-H-D$

من ١ و ٢ يكون لدينا C-A-H ← C-A-H-D

C-H-D

وحسب Th4 : C-A-D

وبالتالي فان $A \in C-D$

ولكن $C-D=A-B$

وبالتالي $A \in A-B$

تناقض مع Th10 :

الحالة الثالثة : مشابهة تماما الى الحالة الثانية.

اذن $\{A,B\}=\{C,D\}$

مبرهنة ١٥ :

لتكن $A-B$ قطعة مستقيم وان $A-R-B$ فان
 $A-R \subseteq A-B$
 $R-B \subseteq A-B$

البرهان :

لكي نبرهن ان $A-R \subseteq A-B$ ،

يجب ان نبين اذا كان $X \in A-R$ ، فان $X \in A-B$

$X \in A-R \leftarrow A-X-R$ ، ومن الفرض $A-R-B$

حسب Th4 : $A-X-R-B$

$A-X-B \leftarrow$

$X \in A-B \leftarrow$


وبنفس الطريقة ، نستطيع ان نبرهن ان $R-B \subseteq A-B$

مبرهنة ١٦ :

أي نقطة R في القطعة $A-B$ تفصل $A-B$ الى مجموعتين جزئيتين غير خاليتين $R-B$ و $A-R$ اللتين مع $\{R\}$ تكون تجزئة للقطعة $A-B$.

البرهان :


H.W



ولو اخذنا التقابل التالي :

A=1
 B=2
 C=4
 D=5
 E=3
 F=7
 G=8
 H=9
 I=6

نلاحظ هذا التقابل (بحيث يجب ان يحفظ العلاقات) فمثلا بما ان A,B,C تقع على المستقيم k1 ، فيجب ان يكون هناك مستقيم يناظر k1 بحيث يحتوي على النقاط 1,2,4 . كما يوجد تناظر لبقية المستقيمات كما مبين ادناه :



اذن يوجد تشاكل .



وهذا تناقض مع Th1 .
اذن لا يوجد اكثر من 7 نقاط .
اذن عدد النقاط بالضبط 7 .

مبرهنة رقم (11):

أي نقطة يمر بها بالضبط ثلاثة مستقيمات.

البرهان:

لنأخذ النقطة 5 مثلا يمر بها المستقيمات (1,6,5)، (7,5,3) و (6,5,4) (السبب في كون هذه المستقيمات مختلفة)؟
والآن نفرض مستقيم آخر (رابع) يمر بالنقطة 5 .
حسب (Ax^2+Ax^5) : يحتوي المستقيم الرابع على ثلاث نقاط بالضبط احدهما النقطة 5 التي تختلف عن النقاط $\{1,2,3,4,6,7\}$.
ولو كانت النقطتين الاخرتين هما 1,4 فالمستقيم الرابع (5,1,4) سيقطع المستقيم (1,4,7) في نقطتين مختلفتين ، وهكذا بالنسبة لبقية النقاط .
اذن لا يوجد مستقيم رابع .
اذن عدد المستقيمات المارة بالنقطة 5 هو ثلاث مستقيمات فقط .
وهكذا بالنسبة لبقية النقاط .

مبرهنة رقم (12):


يحتوي نظام فانو على سبعة مستقيمات فقط .
البرهان: ؟

نظام يونغ

The System of Young

: يتضمن بديهيات المستوى التالي + البديهية الاتية " اذا كان α مستقيما ، فانه توجد على الاكثر ثلاث نقاط تقع على α ."
البديهيات

α : أي نقطتين مختلفتين A,B في α يحتويهما مستقيم واحد فقط .
 α : كل مستقيم يحتوي على ثلاث نقاط في الاقل .



مبرهنة رقم (٩):

إذا وجد مستقيم واحد يحتوي بالضبط على n من النقاط ، فإن أي مستقيم يحتوي بالضبط على n من النقاط.

البرهان:

ليكن l مستقيماً يحتوي بالضبط على n من النقاط . وليكن m أي مستقيم آخر . يجب ان نبرهن ان m يحتوي بالضبط على n من النقاط. اما m يقطع l ، او لا يقطعه.

إذا لم يقطع l ، فمن Th 7 ، يحتوي m بالضبط على n من النقاط.

نفرض ان m يقطع l في نقطة، ولتكن P .

مبن Th 8 ، يوجد بالضبط $n-1$ من المستقيمت الموازية الى l .


من Th 4,5 ، m يقطع l والمستقيمت الموازية له في n من النقاط وبضمنها P .

نفرض وجود نقطة اخرى على m .

من Ax4 ، يوجد موازي اخر الى l من هذه النقطة، ولكن هذا يخالف Th 8 ، لذلك فان m يحتوي بالضبط على n من النقاط.

نفرض ان α مستقيم يحتوي بالضبط على n من النقاط P_1, P_2, \dots, P_n . ليكن m أي مستقيم يوازي α . يجب ان نبرهن ان m يحتوي بالضبط على n من النقاط. من AX_2 ، توجد نقطة Q_1 على m . ومن AX_1 ، يوجد المستقيم P_1Q_1 . من P_2, \dots, P_n ومن $Th 6$ ، هذه المستقيمتان تكونان متوازيتان ومن $Th 4,5$ ، تقطع هذه المستقيمتان المستقيم m في $n-1$ من النقاط المختلفة، ولتكن Q_2, \dots, Q_n والتي تختلف عن Q_1 (من تعريف التوازي). من هذا نستنتج على انه توجد على الأقل n من النقاط على m .

لكي نبرهن على وجود على الاكثر n من النقاط على m ، نفرض وجود نقطة اخرى Q_{n+1} على m . من AX_4 ، يوجد مستقيم يمر من Q_{n+1} ويوازي P_1Q_1 . من $Th 4,5$ ، هذا المستقيم يقطع α في نقطة غير النقاط P_1, \dots, P_n ، وهذا يخالف الفرض بان α يحتوي بالضبط على n من النقاط.



اذا كان أي مستقيم α يحتوي بالضبط على n من النقاط، فانه توجد بالضبط $n-1$ من المستقيمتان الموازية الى α .

البرهان:

ليكن α مستقيماً يحتوي بالضبط على n من النقاط ولتكن، P_1, P_2, \dots, P_n . ولتكن P نقطة لاتقع على α (AX_3).

من AX_1 ، يوجد المستقيمان pp_1, pp_k حيث P_k أي من النقاط (P_2, P_n) .

من AX_4 ، يوجد بالضبط $n-1$ من المستقيمتان الموازية الى pp_1 والتي تمر من النقاط P_2, P_3, \dots, P_n (احدهما سيمر بالنقطة P_k). من $Th 4,5$ المستقيم pp_k الذي يقطع pp_1 والمستقيم الموازي له من P_k ، يجب ان يقطع كل من الخطوط الاخرى الموازية الى pp_1 في نقطة واحدة فقط. لذلك، عدد نقاط التقاطع هذه عبر pp_k تكون بالضبط n من النقاط.

من AX_4 و $Th 4$ ، يوجد بالضبط $n-1$ من المستقيمتان الموازية الى α من n من النقاط على الخط pp_k عدا P_k (حيث ان P_k تقع على α).

نفرض على انه يوجد موازي اخر الى α ، ومن $Th 4,5$ هذا المستقيم سيقطع pp_k في النقطة R التي تختلف عن نقاط تقاطعه مع pp_1 والمستقيمتان الموازية له. ومن AX_4 ، يوجد موازي من

مبرهنة رقم (٥):

إذا قطع مستقيم احد مستقيمين متوازيين، فإنه يجب ان يقطع الاخر.

البرهان:

ليكن k, l مستقيمين متوازيين، وان m مستقيم اخر يقطع k في نقطة P . يجب ان نبرهن ان m يقطع l في نقطة ما. نفرض ان العبارة خطأ، أي ان m يوازي l ، فإنه من P سيكون هنالك المستقيمان k, m يوازيان l ، وهذا يخالف 4 . لذلك فان الفرض يجب ان يكون خاطئاً. وهكذا، اذا قطع خط احد مستقيمين متوازيين، فإنه يجب ان يقطع الاخر.

مبرهنة رقم (٦):

المستقيمان الموازيان للمستقيم نفسه متوازيان.

البرهان:

ليكن k و l مستقيمين متوازيين، و m مستقيماً متوازيين. يجب ان نبرهن ان k و l متوازيان. نفرض ان العبارة خطأ. فاذا كان k لا يوازي m ، فإنه يقطع m . ومن $Th 5$ ، فان k يجب ان يقطع l ، وهذا يناقض الفرض بان k يوازي l . وهذا يؤدي الى تناقض مع فرضيتنا.


مستويات تالفة منتهية:

هو مجموعة منتهية تحقق بديهيات المستوى التالفي.

مبرهنة رقم (٧):

إذا وجد مستقيم واحد يحتوي بالضبط على n من النقاط، فان أي مستقيم يوازي l يحتوي بالضبط على n من النقاط.

البرهان:



ثانيا: المستوى التالفي : Affine Plane

يتضمن المستوى التالفي من مجموعة α من كلمات اولية تقنية تدعى نقاط ، ومجموعات جزئية من α تدعى مستقيماً ، والتي هي ايضا تقنية .

ملاحظة: سنرمز للنقاط والمستقيماً في α نفس الرموز المستخدمة في النظام الاسقاطي .

البديهيات

- AX1: أي نقطتين مختلفتين A, B في α يحتويهما مستقيم واحد فقط .
- AX2: كل مستقيم يحتوي على ثلاث نقاط في الاقل .
- AX3: يوجد في الاقل نقطة واحدة A ومستقيم واحد l بحيث ان $A \notin l$.
- AX4: اذا كان l مستقيماً و A نقطة بحيث ان $A \notin l$ ، فانه يوجد مستقيم واحد فقط m يحتوي A بحيث ان $l \cap m = \emptyset$.

تعريف رقم (١):

يقال لمستقيمين مختلفين انهما متوازيان ، اذا كان $l \cap m = \emptyset$.

اذن يمكن ان نعيد نص بديهية رقم ٤ بالشكل التالي: "اذا كان l مستقيماً و A نقطة بحيث ان $A \notin l$ ، فانه يوجد مستقيم واحد فقط m يمر من A ويوازي l ."

مبرهنة رقم (٤):

أي مستقيمين مختلفين في مستوى تالفي يشتركان في نقطة واحدة على الاكثر .

البرهان :

نفرض ان العبارة خطأ . فيوجد مستقيمان مختلفان l, m يشتركان في نقطتين في الاقل ، ولنكن $Q \& P$. ولكن هذا يناقض $AX1$ ، حيث ان $Q \& P$ تقعان على المستقيمين l, m ، وان $AX1$ تنص على انه لكل نقطتين معلومتين ، يوجد مستقيم واحد فقط يحتويهما .

لذلك ، فان فرضيتنا تؤدي الى تناقض . وبهذا فان أي مستقيمين يشتركان في نقطة واحدة على الاكثر . أي ان ، المستقيمين اما يكونا متوازيين او يتقاطعان في نقطة واحدة فقط .

مبرهنة رقم (3):

إذا وجدت بالضبط n من النقاط على مستقيم لمستوي اسقاطي منته . فان المستوي يحتوي بالضبط على $n^2 - n + 1$ من النقاط.

البرهان:

ليكن l مستقيماً يحتوي بالضبط على n من النقاط، ولتكن P_1, P_2, \dots, P_n من l ، توجد نقطة P لاتقع على l .

ومن l ، توجد n من الخطوط المختلفة $PP_1, PP_2, PP_3, \dots, PP_n$. ومن l ، توجد نقطة ثالثة على كل خط من هذه الخطوط، ولتكن Q_1, Q_2, \dots, Q_n على التوالي.

نأخذ النقطة Q_1 ونصلها بالنقاط P_1, P_2, \dots, P_n .

فنحصل على n من الخطوط $Q_1P_1, Q_1P_2, \dots, Q_1P_n$ هذه الخطوط تقطع PP_2 في n من النقاط المختلفة.

لذلك PP_2 يحتوي على $n-1$ من النقاط عدا P . ان هذا يصح لكل من المستقيمات PP_1, PP_2, \dots, PP_n . وبهذا ، n من الخطوط ، وكل خط منها يحتوي على $n-1$ من النقاط، ومع النقطة P ، يحتوي المستوي على $n^2 - n + 1 = n(n-1) + 1$ من النقاط في الاقل.

لكي نبرهن ان المستوي يحتوي على $n^2 - n + 1$ من النقاط على الاكثر ، نفرض وجود نقطة اخرى Q ، لاتقع على أي خط من تلك الخطوط. الخط QP يختلف عن الخطوط المذكورة. من l ، QP يقطع l في نقطة P_{n+1} التي تختلف عن النقاط P_1, P_2, \dots, P_n . وبهذا يحتوي l على $n+1$ من النقاط وهذا يخالف الفرض.

نتيجة: اذا كان في المستوي الاسقاطي مستقيم يحتوي بالضبط على n من النقاط ، فان أي مستقيم اخر يحتوي بالضبط على n من النقاط.

المبرهنة Theorem

هي النتيجة التي نحصل عليها من بديهيات النظام او من عبارات في هذا النظام . علم الهندسة نظام بديهي لاننا نستخدم مجموعة من تعاريف ، بديهيات ، ومبرهنات . اقرب وافضل مثال عن النظام البديهي هو الهندسة الاقليدية .

امثلة عن انظمة بديهية منتهية (تحتوي عدد منته من العناصر)
تعتمد على النقطة والمستقيم ككلمات اولية .

اولا: المستوى الاسقاطي : Projective Plane

يتكون من مجموعة نرمر لهذه المجموعة بالرمز π وتتضمن كلمات اولية تقنية تدعى نقاط ، يرمز لها بحروف كبيرة A,B,C ومجموعات جزئية من π تدعى مستقيمات ، يرمز لها بحروف صغيرة l,m,n,\dots .

البديهيات :

- AX1 : أي نقطتين مختلفتين في π يحتويهما مستقيم واحد فقط .
- AX2 : كل مستقيم يحتوي على ثلاث نقاط في الاقل .
- AX3 : توجد في الاقل نقطة واحدة A و يوجد في الاقل خط واحد l بحيث ان $l \ni A$.
- AX4 : أي مستقيمين يشتركان في نقطة واحدة في الاقل .

مبرهنة رقم (1):

أي مستقيمين مختلفين في المستوى الاسقاطي يشتركان في نقطة واحدة فقط .
البرهان:

ليكن l,m مستقيمين مختلفين في π .
 l,m مختلفين يعني ان $l \neq m$.

من AX4 توجد نقطة A بحيث ان A تنتمي الى l و A تنتمي الى m .
نفرض انه توجد نقطة اخرى B تختلف عن A بحيث ان B تنتمي الى l و B تنتمي الى m .
فانه من AX1 ، $l=m$. وهذا تناقض مع الفرض ($l \neq m$) .
وبهذا فان l,m يشتركان في نقطة واحدة فقط .

مبرهنة رقم (2):

أي نقطة في المستوى الاسقاطي هي عنصر لثلاثة خطوط في الاقل .
البرهان:

لتكن P أي نقطة في π

من AX3 ، يوجد مستقيم l ، بحيث ان $P \in l$.
من AX2 ، توجد ثلاث نقاط في الاقل على المستقيم l ولتكن A_1, A_2, A_3 .
من AX1 ، توجد الخطوط PA_1, PA_2, PA_3 التي تمر من P وتكون مختلفة .

مستويات اسقاطية منتهية:

المستوى الاسقاطي المنته : هو مجموعة منتهية تحقق البديهيات اعلاه .


الفصل الاول

مكونات النظام البديهي (تعريف ، مجموعة بديهيات ومبرهنات)

التعريف : أي تعريف لأي مصطلح في الرياضيات يجب ان يعبر عنه ببساطة ، ان يكون غير دوري ويصف بطريقة وحيدة الكلمة المراد تعريفها .
فالبساطة : تعني ان نعبر عن الكلمة المراد تعريفها بكلمات ابسط منها ، أي بكلمات معروفة .
الدورية : عند تعريف كلمة ما فاننا سنمر بسلسلة من التعاريف التي قد تنتهي بنفس الكلمة .
الوصف الوحيد : ان التعريف الدقيق لكلمة ما يجب ان يصف هذه الكلمة بطريقة بحيث لاينطبق هذا الوصف على كلمة اخرى .

لحل هذه المشكلة : نختار بعض الكلمات بدون تعريف لتكون كلمات اولية او كلمات غير معرفة وبدلالاتها تعرف بقية الكلمات او المصطلحات في النظام .

الكلمات الاولية



البديهيات Axioms

البديهية : "هي بعض العبارات البسيطة التي تتعلق بالكلمات الاولية كاساس ومنها نستنتج العبارات الاخرى في النظام . هذه العبارات الاساسية التي نتقبلها بدون برهان تدعى بديهيات والتي هي حجر الاساس للبناء" .

لقد عرف هيلبرت البديهية في نظامه البديهي للهندسة الاقليدية مايلي: " اذا اخذنا بعض الكلمات لتكون اولية ، فان البديهيات هي مجرد فرضيات حول تلك الكلمات الاولية" .
الكلمات الاولية مجرد متغيرات ← البديهيات جمل مفتوحة وبالتالي لايمكن ان يقال انها اما صائبة او خاطئة ، وعليه فان البديهية لا تحتاج الى برهان .



لم تقتصر العلوم في حضارة وادي الرافدين على الصناعات او الحرف فقط ، فالبابليين على الأخص حارلوا اكتشاف أشياء اضافوها إلى معارفهم ، والدالة على القيمة العلمية للتراث الذي خلفه البابليون هي الرياضيات ومن فروعها الهندسة. لقد عرفوا الهندسة لحاجتهم في مسح الأراضي وتشييد القصور والمعابد وإقامة السدود وخزانات المياه.

انجازات البابليون في مجال المعرفة (الهندسة) لخواص بعض الاشكال ومساحتها وعلاقة اجزائها بعضها ببعض ، فقد استطاعوا ان يحسبوا سطوح اشكال هندسية معينة ، كحجم متوازي المستطيلات القائم ، حجم الاسطوانة القائمة ، كما عرفوا الدائرة وترها وقوسها ثم مساحتها. ميرهنة فيثاغورس معروفة لدى البابليين " لوح مستطيل عرضه ١٠ م، وطوله ٤٠ م فما هو قطره "

اما في بلاد وادي النيل فقد كانت الهندسة العملية في مستوى جيد وذلك بسبب حاجتهم لتحديد الاراضي الزراعية بعد فيضان النيل كل عام . لقد عرف المصريون ايجاد مساحات بعض الاشكال الهندسية كالمثلث ، الدائرة، المستطيل وكذلك وجدوا قواعد لايجاد حجوم بعض الاشكال كالمكعب ، متوازي المستطيلات ، الاسطوانة والهرم الناقص. لقد سبق المصريون اليونانيين في تطبيق نظرية فيثاغورس ، حيث عرفوا ان المثلث الذي تكون نسبة اضلاعه الى بعضها الاخر ٣,٤,٥ هو مثلث قائم الزاوية ، كما استخدموا الحجارة المكعبة الشكل في بناء الاهرام ، حسبوا النسبة الثابتة $(\frac{16}{9})^2$ أي مايقارب ٣,١٦٠٤ وعرفوا نصف الكرة.....الخ.

الهندسة عند الاغريق: كانت مقتبسة من البابليين والمصريين الا انهم درسوها علميا واطافوا اليها اضافات هامة ، لذلك نسب علم الهندسة الى اليونان وحدها. من ابرز علماء الهندسة في اليونان هو " اقليدس " في حوالي سنة ٣٠٠ ق.م حيث وضع اول كتاب في الرياضيات مبني على نظم البديهيات هو كتاب " الاصول " . (خلف عصر افلاطون ، وهو اول استاذ للرياضيات في جامعة الاسكندرية). برزت في اليونان عدة مدارس اهتمت بالهندسة على الاخص ومنها

- ✦ المدرسة اليونانية من ابرز تلامذتها " طاليس " ، اكتشف بعض الحقائق اهمها (قطر الدائرة ينصفها ، الزاويتان المتقابلتان بالرأس متساويتان.....الخ.
- ✦ المدرسة الفيثاغورية (" فيثاغورس " الذي كان احد طلبة طاليس) درس الفيثاغوريون الصفات الهندسية للاعداد واطلقوا على بعضها صفة اعداد مثلثة وعلى الاخر صفة اعداد مربعة واهم اكتشاف هو البرهان الهندسي لنظرية فيثاغورس. دامت المدرسة الفيثاغورية من بعد فيثاغورس مائتي سنة وكان " ابيقراط " ٤٣٠ ق.م اول من حاول بناء نظام منطقي للهندسة وصياغتها بسلسلة من النظريات المبنية على عدد من البديهيات والتعاريف.
- ✦ المدرسة الاثنية من اشهر علمائها " افلاطون " ٣٩٩ ق.م الذي كان متأثرا بالفيثاغوريين وهو الذي قال " بان الرياضيات افضل تمرين للعقل ". تناول الرياضيات من جانبها النظري المجرد لا من جانبها العملي.