

البكتيريا Bacteria

ارتبط اسم البكتيريا كثيراً بالأمراض التي تسببها للإنسان ولكن الاكتشافات الحديثة والتقدم السريع الذي حدث في العلوم التطبيقية أظهرت أن البكتيريا تلعب دوراً هاماً في كثير من الصناعات الغذائية والدوائية والتخلص من المواد العضوية وغير العضوية وكذلك معالجة المياه العادمة والمعالجة الحيوية لمخلفات المزارع واستخدامها في إنتاج الطاقة وغاز الميثان.


وهي كائنات دقيقة مجهرية حية بدائية النوى تتميز ببساطة التركيب لا ترى بالعين المجردة بل تحت عدسات المكبرات البسيطة والمركبة وابعادها بحدود 0.5-5 ميكرومتر ومعظم الخلايا البكتيرية لا تحتوي على الكلوروفيل إلا أنواع قليلة منها. ولذلك فإن معظم أنواع البكتيريا تعيش مترممة أو متطفلة على الكائنات الحية الأخرى كما أن البكتيريا إما أن تكون متحركة بأسواط أو غير متحركة. ولكل نوع من البكتيريا شكله الخاص وتركيبه الخاص وعلاقته الخاصة بالمواد الأخرى من حيث النمو والنشاط. تتواجد في الطبيعة داخل الأجسام وعلى سطح المواد الغذائية وفي الماء والهواء وفي طبقات التربة السطحية. وفي دم الحيوانات السليمة وقمم الجبال المغطاة بالثلوج وخلايا النبات. وتعد أكثر الكائنات المجهرية انتشاراً بسبب صغر حجمها وتكيفها للظروف البيئية المحيطة بها.

الأسباب التي تجعل البكتيريا من أكثر الأحياء الدقيقة انتشاراً في الطبيعة:

1. صغر حجمها.
2. سرعة تكاثرها.
3. تنوعها الغذائي.
4. اتساع وتنوع مداها البيئي (هوائية، غير هوائية، درجات حرارة متباينة).

وأول من اكتشف هذه الأحياء هو العالم مولر Moler حيث شاهدها من خلال عدسات صنعها العالم الهولندي لوفنهوك Lufenhok عام 1676 ، وبعده عمل العالمان شيفان Shifan ولاتور Lator على فصل البكتيريا من بين مجاميع مختلفة من جراثيم الخمائر الموجودة وسط سوائل حاوية على مواد عضوية قابلة للتحلل البروتيني، ثم توالى بعدهما علماء كثيرون مثل باستور عام 1850 وكوهن عام 1871 ولستر عام 1860 في دراسة هذه الأحياء الدقيقة وقسموها إلى بكتيريا طبية Medical Bacteriology وبكتيريا صناعية Industrial Bacteriology وبكتيريا زراعية Agricultural Bacteriology وبكتيريا غذائية Bacteriology Food.

Shape of some bacteria أشكال بعض البكتيريا



أولاً: الشكل الكروي (Coccus Shape (Spherical))

ثانياً: الشكل العصوي (Bacillus (Rod))


- شبه عصوية
- المستطالية ذات النهاية الحادة او المثلثة
- ذات النهاية المربعة

ثالثاً: الشكل اللولبي او الحلزوني (Spiral)

- منحنية Vibrio تأخذ شكل Curved ويطلق عليها الوابو او الضمة مثل *Vibrio cholerae* المسببه لمرض الكوليرا
- متعددة الانحناءات Spirillum
- الملتوية او المثنية Spirochete

رابعاً: الشكل الخيطي (Filamentous bacteria)


تمثل الاكتينومييسينات Actinomycetec او الاكتينوبكتيريا Actinobacteria مجموعة من البكتيريا تتميز بانها تنمو على هيئة خيوط تشبه الغزل الفطري mycelium ، حيث كان يعتقد سابقا انها من الفطريات ، و لكن نظراً لطبيعة تركيب الجدار الخلوي و لكونها تحتوي على مادة وراثية غير محاطة بغشاء نووي و لا توجد نوية - تم وضعها ضمن مملكة البكتيريا (بدائيات النواة). تحتوي على أنواع وحيدة الخلية إلا أنها أكبر حجماً "نسبياً" من البكتيريا العصوية وتتخذ شكل (L,X,Y)



تجمعات البكتريا Arrangements of Bacteria

تتكاثر البكتيريا لاجنسيا بواسطة الانقسام البسيط Simple fission وتظل الخلايا المنقسمة متلاصقة مع بعضها في مجموعات خلوية تختلف في الشكل والتركيب تبعاً للنوع. هذه التجمعات لها أهمية في عملية التقسيم والتعريف لأنواع البكتيرية.

Cocci



الكروية Coccus:

1- بكتريا كروية ثنائية Diplococcus


2- بكتريا كروية مسبحية Streptococcus

3- بكتريا كروية رباعية Tetrads

4- بكتريا كروية مكعبة Sarcinae

5- بكتيرية كروية عنقودية Staphylococcus

Bacilli



العصوية Bacillus:

1- ثنائية

2- مسبحية او سلسلة

3- والملتصقة من الجوانب Palisade

حركة البكتريا Movement of Bacteria

1- غير متحركة non-Motile 2- متحركة Motile

- حركة انزالية: **Gliding movement** يتميز بهذه الحركة افراد البكتريا الهلامية Myxobacteria

وافراد الجنس Beggiatoa

- حركة دودية الانثنائية **Flexion movement** او حركة دائرية سريعة على طول محور الخلية مثل


Spirochetes

- حركة البكتيريا هي حركة حقيقية **true (vital) movement** ترجع الى وجود السواط flagella

موقع السواط بالنسبة للخلية البكتيرية:

- 1- سواط طرفي Polar flagella قاعدة السوط موازية للمحور الطولي للخلية
- 2- سواط تحت طرفي Subpolar يوجد بالقرب من الطرف وقاعدة السوط تكون متعامدة مع المحور الطولي
- 3- سواط جانبي Lateral: السوط على النصف الوسطي للخلية

توزيع السواط flagella distribution :



1- polar monotrichous

سواط واحد عند احد طرفي الخلية البكتيرية

2- Lopotrichous

تحتوي على 2 او اكثر من السواط عند طرف واحد

3- amphitrichous

سواط واحد عند كمال الطرفين

4- peritrichous flagella

اسواط محيطية موزعة عند عدة نقاط على امتداد سطح الخلية.

شكل الحركة في السوط:

1- عكس او باتجاه عقارب الساعة

2- حركة دودية



انجذاب البكتريا وتحركها:

1- نحو الضوء

2- المواد الكيميائية

3- المضادات


تركيب البكتريا Structure of Bacteria



- التراكيب الخارجية:

1- جدار الخلية Cell Wall

تحاط الخلية البكتيرية بجدار يعطي لها شكلاً ثابتاً يقوم بحماية محتوياتها الداخلية. ويتركب الجدار من جزيئات متركمة من مادتين هما مادة كربوهيدراتية وبيبتيدات . اما الأولى فهي عبارة عن بلمر **polymer** من كل من حمض اسيتيل موراميك وحمض اسيتيل جلوكوزامين متبادلين. وأما البيبتيدات فهي قصيرة وتربط السلاسل الكربوهيدراتية بعضها ببعض ، وتسمى هذه المادة بالميورين **Muren** او **Peptidoglycan** ومن المركبات الرئيسية في جدار الخلية الأحماض الأمينية والسكريات والدهون، ويتراوح سمك جدار الخلية البكتيرية ما بين 1 – 25 ملي مايكرون. ويلعب جدار الخلية البكتيرية دوراً هاماً في تقسيمها إلى نوعين رئيسيين تبعاً لتقيل البكتيريا لنوع من الصبغات يسمى **Gram stain** وتعتمد هذه الصبغة على إضافة محلول الكريستال البنفسجي واليود إلى غشاء بكتيري فتتغذ هاتان المادتان من الجدار الخلوي وتلون السيترولازم باللون البنفسجي أو الأزرق وعند غسل الخلايا بالكحول فإن بعض هذه الخلايا لا يسمح بخروج الصبغة مرة أخرى وبذلك تحتفظ باللون البنفسجي أو الأزرق وتعرف هذه البكتيريا بأنها موجبة لصبغ كرام **Gram +ve** أما أنواع البكتيريا التي لا يستطيع جدارها الاحتفاظ بالصبغ ويسمح بخروجها مع الكحول فتصبح عديمة اللون ويمكن صبغها بعد ذلك بصبغة معاكسة مثل صبغة الصفرانين الحمراء وتعرف هذه البكتيريا بأنها سالبة لصبغ كرام **Gram - ve** وتعتبر صبغة جرام من الصفات الهامة في التعرف على البكتيريا ولها دور مهم في تشخيص الكثير من الأمراض التي تسببها.



2- العلية او المحفظة Capsule

الكبسولة عبارة عن طبقة هلامية تكون غلافا حول الخلية وتتكون من مادة كاربوهيدراتيه وتقوم هذه الطبقة بحماية الخلية البكتيرية من الظروف البيئية غير المناسبة مثل الجفاف أما عند وجود هذه الطبقة حول خاتيا البكتيريا المسببة لبعض الأمراض فيكون دورها هو حماية الخلية من الإفرازات التي يفرزها الجسم لمقاومة هذه البكتيريا .

تتركب الكبسولة من مواد عديدة التسكر كما في الجنس Streptococcus pneumoniae

او من عديدات الببتيد كما في الجنس Bacillus anthracis

او من خليط من عديدات التسكر و عديدات الببتيد كما في الجنس Bacillus megaterium

للكبسولة عدة وظائف منها:

1- حماية الخلية من الجفاف


2- عامل ضراوة Virulence factor اي تساعد البكتيريا على احداث الامراض عن طريق مقاومة الخلايا الاكولة.

الاسواط Flagella: هي خيوط دقيقة جدا وطويلة من البروتين تخرج من السوبالزم خلال الجدار الخلوي وطبقة الغلاف. يتراوح سمك السوط من 10-30 نانومتر (nm) قد يصل طوله الى 15-20 ميكرومتر (μm) السوط يكون متعرج وطول الموجة غالبا يكون ثابت للسلسلة البكتيرية الواحدة. ال يرى بالمجهر الضوئي ال بطرق صيغ خاصة. افضل طريقة تحديد عدد وتوزيع الاسواط على الخلية هو استعمال المجهر الالكتروني.

3- تركيب السواط □ Flagella Structure

تركيب السواط من بروتين اجوف يسمى Flagellin و يتكون السوط البكتيري من الخيط Filament الذي يرتبط مع الخطاف Hook المتصل مع الحبيبة القاعدية Basal granule (او الجسم القاعدي Basal body) التي تنشأ من الغشاء البلازمي رسم تخطيطي لمكونات السوط البكتيري ، الحظي الخيط Filament المتصل بالخطاف Hook المرتبط مع الحبيبة القاعدية و التي هي عبارة عن عمود Rod يمر خلال عدد من الحلقات.

تركيب الحبيبة القاعدية في البكتيريا سالبة لجرام م انها تتكون من العمود الذي يمر خلال 4 حلقات ، الحلقة M و الحلقة S تليها الحلقة P و اخيرا الحلقة L في حين ان الحبيبة القاعدية في البكتيريا الموجبة لجرام تتكون من العمود الذي يمر خلال حلقتين فقط ، الحلقة M و الحلقة S السبب في وجود 4 حلقات في الحبيبة القاعدية في سوط البكتيريا السالبة الجرام (L) هو لتدعيم تثبيت السوط خلال الجدار الخلوي الذي يتكون من طبقة رقيقة من Peptidoglycan تعلوها طبقة الغشاء الخارجي Outer membrane ايضا نلاحظ وجود الطقتين M و S في كال نوعي البكتيريا انها هي الحلقات المسؤلة عن دوران الخيط في عكس اتجاه دوران عقارب الساعة (الحظ حركة السهم الوجود على الخطاف في الرسم الطوي) و ينتج عن دوران الخيط في عكس اتجاه عقارب الساعة حركة الخلية حركة تقدمية لالمام.



4- الاهداب او الشعيرات pili

هي عبارة عن زوائد رفيعة جداً وقصيرة جداً وتحيط الخلية من جميع جهاتها، وتتواجد في البكتيريا المتحركة وغير المتحركة، وتسمى بالشعيرات. وأعداد هذه الشعيرات كبير جداً يقر بالمئات وهي أقصر من الأسواط. وكان يعتقد ان لهذه الشعيرات أي دور في حركة البكتيريا بسبب وجودها في البكتيريا المتحركة والثابتة وإنما وجد أن هذه الشعيرات تساعد البكتيريا على الالتصاق بالأسطح كما توجد بعض من هذه الشعيرات تعمل قنوات اتصال بين الأنواع المتشابهة من البكتيريا في حالة نقل بعض الصفات الوراثية بينهم خلال عملية تزواج بدائية

- التركيب الداخلي:

1- الغشاء البلازمي Plasma membrane

هو غشاء رقيق جداً يقع تحت جدار الخلية ويغلف السيتوبلازم و يتراوح سمكه بين 1 - 2 ملليمكرون ويمتاز بخاصية " النفاذية الاختيارية " حيث يسمح بمرور الماء وبعض المواد الغذائية اللازمة للنمو والنشاط والحيوية دون مواد أخرى . و يتركب هذا الغشاء من طبقتين من مواد كيميائية تسمى دهون الفوسفات Phospholipids تظهر فيها بعض المركبات البروتينية، يقوم هذا الغشاء ببعض العمليات الحيوية لتحطيم المواد السكرية لإنتاج الطاقة ، وذلك بسبب احتوائه على عدد من الإنزيمات الضرورية مثل إنزيمات التنفس.

2- الميزوسوم: mesosome

تركيب غشائي ذو تركيب خاص متصل بالغشاء البلازمي يحتوي بعضها على أصباغ وإنزيمات يعتقد ان لها دور في عملية البناء الضوئي والتنفس الهوائي. ويشير البعض الآخر الى ان لها دور في عملية عزل كروموسوم الخلية البكتيرية اثناء الانشطار.

3- الابواع الداخلية: Endospore

هي عبارة عن أجسام بيضاوية الشكل صغيرة الحجم تتكون عند بعض أنواع البكتيريا القادرة على ذلك في حالة تعرضها لظروف قاسية ووظيفةها المقاومة، فإذا ما تحسنت الظروف تعود الأبواع لتتحول إلى خلايا خضرية. و توجد عادة في بعض أنواع البكتيريا العصوية و هي على درجة كبيرة من المقاومة للظروف المحيطة مثل الحرارة المرتفعة والبرودة والجفاف والضغط الأسموزي المرتفع والمواد الكيميائية. وتستطيع التعيش مع مثل هذه الظروف القاسية في الوقت التي لا تستطيع الخلايا البكتيرية الخضرية أن تتحمل الحياة في مثل هذه الظروف. وتتكون الجرثومة الداخلية في هذه الأنواع من البكتيريا بانكماش السيتوبلازم داخل الخلية متخذاً شكلاً كروياً أو بيضياً ثم يحيط نفسه بجدار سميك وتتخذ الجرثومة الداخلية وضعاً طرفياً أو تحت طرفي أو وسطياً على حسب نوع الخلية البكتيرية. وتبقى الجراثيم الداخلية في حالة كهون حتى إذا تهيأت الظروف الملائمة فتمتص الماء وتتفخ ويمزق جدار الجرثومة الخارجي وتخرج محتوياتها الداخلية لتنمو إلى خلية جديدة. و لا تعتبر عملية إنتاج الأبواع عملية تكاثرية لأنه لا يحدث أية زيادة في العدد . في العادة كل خلية خضرية تنتج بوغاً واحداً، ولكن

هناك أنواع من البكتيريا قد تنتج أكثر من بوغ واحد من خلية واحدة . ويمثل البوغ الطور الساكن للخلية البكتيرية.

4- الساييتوبلازم

يتكون الساييتوبلازم من خليط معقد من مواد بروتينية و كربوهيدراتية ودهون وأحماض أمينية وأملاح وفيتامينات. وتوجد بعض هذه المواد مذابة في الماء أو معلقة فيه. ويعتبر الساييتوبلازم مركز العمليات الحيوية بالخلية ، وهو يتكون من حوالي 85% من وزنه ماء و 15% مواد صلبة. بالإضافة إلى المواد السابقة يحتوي الساييتوبلازم على مواد غذائية Polyphosphates منخدة مثل الحبيبات الفوليتينية وهي عبارة عن عديدات الفوسفات وجليكوجين. وكذلك من الممكن أن نجد عنصر الكبريت والديد كمواد غذائية مختزنة في بعض أنواع البكتيريا. و يمكن تقسيم المادة الخلوية داخل الساييتوبلازم إلى ثلاثة مناطق أو أقسام أ - منطقة ساييتوبلازمية حبيبية الشكل وغنية بمادة ال RNA .:

ب - منطقة كروماتينية غنية بمادة ال DNA

ج - الجزء السائل الذي يحتوي على المواد الغذائية الذائبة. تساهم Ribosomes كما توجد بعض الأجسام داخل الساييتوبلازم تسمى الريبوسومات في تكوين البروتين كما توجد مناطق تتجمع فيها حبيبات من مواد مختلفة، وهي تسمى عادة بالحبيبات الساييتوبلازمية.

5- المادة النووية:

لا تحتوي الخلية البكتيرية على نواة مثل أنوية النباتات والحيوانات الراقية . ولذلك والتي تعتبر بمثابة Nucleoids) فهي تحوي أجساماً داخل الساييتوبلازم (الأجسام النووية إلى هذه المنطقة (منطقة الجينوم البكتيري) ولأن هذه DNA التركيب النووي، وينضم ال المواد النووية لا تحاط بغشاء نووي محدد، فقد اصطلح على تسميتها بالأجسام الكروماتينية وتختلف هذه الأجسام عن نواة الكائنات الأخرى بعدم احتوائها على غشاء نووي محدد يفصلها عن بقية الساييتوبلازم .

6- الريبوسومات Ribosomes:

عبارة عن تراكيب صغيرة منتشرة بشكل غير منتظم في ساييتوبلازم الخلية تظهر على شكل مناطق سوداء قاتمة تحت المجهر الإلكتروني يصل عددها إلى حوالي 3000 جزيئة وتسمى الريبوسومات Ribosomes وتراكيبها الكيميائي عبارة عن الحامض النووي الرايبوزي RNA وبروتين وتمثل مناطق بناء البروتين. توجد الريبوسومات بشكل مجاميع تعرف بمتعدد الريبوسومات Polysomes أو Polyrribosomes وتتكون من وحدات ثانوية صغيرة وكبيرة وريبوسومات البكتيريا هي من النوع 70

7- البلازميدات

البلازميدات عناصر وراثية من جزيئات دن ا "DNA" على شكل نواتر صغيرة ، متواجدة داخل سيتوبلازم الخلية البكتيرية، خارج الكروموسوم البكتيري، ولانها منفصلة عن الكروموسوم، فانها تتكاثر بصورة مستقلة عنه، إلا أن هناك بلازميدات يرتبط تضاعفها في الخلية بتضاعف الكروموسوم. وتختلف البلازميدات عن بعضها في الحجم وأعداد النسخ الموجودة بالخلية، وتحمل البلازميدات جينات تضيف للخلية صفات إضافية، إلا أنها غير ضرورية لحياة الخلية، ولا تؤثر على حيوية الخلايا، ويدل على ذلك أنه يمكن لبعض المواد الكيميائية إزالة البلازميدات من الخلية عن طريق وقف تكاثرها، باستمرار تضاعف الخلايا البكتيرية بتناقص أعداد البلازميدات حتى نحصل على خلايا بكتيرية خالية من البلازميدات *cured cells*.

8- الفجوة: Vacuole

ان بعض انواع البكتريا تحتوي على فجوة غازية تسمى بالحوصلة الغازية Gas vesicle والتي تقوم بمساعدة البكتريا على الطفو في الماء وتحمل هذه الفجوات حوالي 40% من حجم الخلية ويختلف عددها في الخلية الواحدة فقد توجد واحدة منها او قد تصل اعدادها الى المئات وتتقلص هذه الفجوات عند تعرضها الى ضغط مفاجئ. ان الترابيب الكيميائي لغلانف الفجوات الغازية هو عبارة عن بروتين بسماك 2 نانوميتر.