



كلية : التربية للعلوم الصرفة

القسم : علوم الحياة

المرحلة: الثانية

أستاذ المادة : أ.م.د. فرقد حواس موسى

اسم المادة باللغة العربية : تشريح النبات

اسم المادة باللغة الإنكليزية : **Anatomy Plant**


اسم المحاضرة الرابعة باللغة العربية: البلاستيدات

اسم المحاضرة الرابعة باللغة الإنكليزية : **Plastids**

## محتوى المحاضرة الرابعة

### 7. البلاستيدات Plastids :-

البلاستيدات هي عضيات مميزة للنبات وهي عادة مستديرة او بيضية او قرصية الشكل قطرها حوالى 4 - 6 ميكرون وتحاط بغشاء مزدوج يسمى الغلاف Envelope وفي داخلها تحتوي على الحشوة او الستروما Stroma مع تراكيب أخرى تسمى الجرانا Grana وهي على شكل أقراص وتتكون من 5 - 50 من الأكياس المفلطحة وهي التي تحوي الكلوروفيلات . البلاستيدات تحوي عادة DNA و RNA ولهذا فهي يمكن ان تتكاثر مستقلة عن انقسام الخلية ويعتقد انها تنشأ من البلاستيدات الأولية Proplastids . توجد البلاستيدات بكثرة في الأنسجة التي تقوم بعملية التركيب الضوئي في جميع النباتات عدا الواطنة منها وهي من الخصائص التي تميز النبات من الحيوان . وقد يوجد في الخلية بلاستيدة واحدة أو أكثر .



يعتمد تصنيف البلاستيدات على وجود أو عدم وجود الصبغات Pigments, فالتى ليست فيها صبغات هي بلاستيدات عديمة اللون و التي فيها صبغات تسمى بلاستيدات ملونة .  
ومن اهم انواع البلاستيدات :-

أ. البلاستيدات الأولية Proplastids :- وهي التي تنمو وتكون البلاستيدات .

ب. البلاستيدات الخضراء Chloroplasts :- وهي تحوي صبغات الكلوروفيلات والكاروتينات , ولها علاقة بعملية التركيب الضوئي حيث تكون ثابتة من حيث الشكل والحجم بعكس الملونة. يتراوح قطرها في النباتات الراقية 4 - 6 مايكرون ويعزى اللون الأخضر إلى وجود الكلوروفيل ووظيفتها إنها تحول الطاقة الضوئية المستمدة من أشعة

الشمس إلى طاقة مخزونة في الغذاء المصنع على صورة سكريات ونشويات ويخزن السكر الزائد في البلاستيده على هيئة نشأ .

جـ. البلاستيدات الملونة Chromoplasts:- ذات ألوان مختلفة الأصفر، البرتقالي، الأحمر ويرجع اللون إلى احتوائها على صبغات كاروتينية , شكلها مختلف أما كروي ، عصوي أو مفصص . منها البلاستيدات الملونة في الجزر وفي بعض الثمار، الأزهار والجذور. هناك مواد ملونة دائبة في العصير الخلوي كالأنثوسيانين التي توجد في جذور الجزر الأحمر والبنجر .



حـ. البلاستيدات عديمة اللون Leucoplasts:- وهي لا تحتوى على الكلوروفيل والكاروتينات , وتنتج بروتينات وزيوت ويمكنها ان تخضر اذا تعرضت للضوء ذات اشكال متغيرة ، بالغة المرونة .

خـ. البلاستيدات النشوية Amyloplasts:- وهي تلعب دورا هاما في تمثيل النشا في خلايا أعضاء معينة مثل درنات البطاطس .

## 8. الماييتوكونديريا Mitochondria :-

مفردها Mitochondrion وهي جسيمات لها عديد من الأشكال والصور محاطة بوحدين غشائيتين يضمن بداخلهما الحشوة DNA وأنزيمات دورة كربس ومركبات عديدة من نواتج التفاعلات الأنزيمية والسيكرومات مما يبين ان وظيفتها هي القيام بعملية التنفس . وهي أجسام بروتوبلازمية حية تنشأ من ماييتوكونديريا سابقة وتوجد مغمورة في الساييتوبلازم شكلها غالبا اسطواني متطول طولها ( 5 – 10 ) مايكرون وعرضها ( 0.5 – 1 ) ميكرون . تتواجد في خلايا حقيقية النواة بأعداد كبيرة وتوجد في الخلايا في المناطق عالية الطلب من الطاقة .

ان عدد الماييتوكونديريا في الخلايا النباتية اقل مما في الحيوانية وذلك نظرا لوجود البلاستيدات الخضراء في الخلايا النباتية. تتركب الماييتوكونديريا بصورة رئيسية من بروتينات ولبيدات وتتميز بوجود أغشية مزدوجة، الغشاء الداخلي يتميز بوجود طيات Crista وان هذه الطيات تعتبر صفة مميزة للماييتوكونديريا إنها تزيد من مساحة سطحها الداخلي وتساعد في انجاز الفعاليات الأنزيمية والتنفسية. إن الدور الرئيسي للماييتوكونديريا في عملية التنفس هو هدم المواد العضوية مثل الكربوهيدرات والدهون التي يتم على خطوات وينتج عنه طاقة يستخدمها الكائن الحي في أداء وظائفه الحيوية. تحتوي الماييتوكونديريا على DNA أي لها مادة وراثية خاصة بها تخزن معلومات وراثية خاصة بتصنيع البروتينات (أي إن لها شبه استقلال وراثي). يملأ الفراغ الداخلي للماييتوكونديريا بسائل يسمى الحشوة Matrix .




## 9. اجسام كولجي Golgi bodies :

تبدو أجسام جولجي في المجهر الالكتروني إنها عبارة عن كومة مكدسة من 5- 15 من الأغشية المرتبطة والمفالطة والمنبسطة وعديد من الحويصلات الكروية الصغيرة تظهر كمجموعة حول هذه الأغشية ويطلق على هذه الأوعية والحويصلات أجهزة كولجي. وتتشابه أغشية اجسام كولجي مع أغشية الشبكة الاندوبلازمية وتحوي الحويصلات على منشآت الجدار الخلوي (مثل البولي سكر ايد ، بروتينات ومركبات اخرى ) وهذه المركبات تتراكم داخل الحويصلات ثم تنتقل عند إتمام الانقسام غير المباشر Mitosis الى الصفيحة الوسطي وتترسب مواد الجدار الخلوي . وعلى ذلك تلعب اجسام جولجي والشبكة الاندوبلازمية دورا هاما في تكوين الجدار الخلوي.

وظائف جهاز جولجي :-

- ينقل البروتينات من الشبكة الاندوبلازمية إلى الجسيمات الخلوية الأخرى.
- إفراز السكريات .
- يفرز من خلايا قنسوة الجذور النباتية سكريات مخاطية تساعد في انزلاق قمة الجذر عندما يخترق التربة .



## ب - المكونات غير الحية Non-Living Components :-

### 1. الفجوات Vacuoles :

توجد الفجوات على هيئة تجاويف داخل الساييتوبلازم مملوءة بالعصير الخلوي Cell sap وتتغير مكوناته من خلية إلى أخرى ، وهي عبارة عن مساحة محاطة بغشاء وتوجد الفجوات العصارية مبعثرة في الساييتوبلازم في الخلايا الحديثة المرستيمية حيث تمتلئ الخلية بالساييتوبلازم الكثيف وعند نضج الخلية تتجمع هذه الفجوات مع بعضها لتكون فجوة واحدة كبيرة في وسط الخلية وتكون محاطة بغشاء هو جزء من الغشاء البلازمي يعرف بـ Tonoplast وهو غشاء مفرد اختياري النفاذية وتدفع الفجوة عند تجمعها من الفجوات الصغيرة الساييتوبلازم ليلصق الجدار كطبقة رقيقة. من وظائف الفجوة المحافظة على استمرارية ضغط الامتلاء Turgor pressure للخلية وهو هام جدا للتركيب الدعامي وللتحكم في حركة الماء . كما أن من مهام الفجوة تخزين المواد الأساسية اللازمة للنشاط التمثيلي للخلية وتخزين منتجات التمثيل الثانوية والمركبات الدفاعية للخلية والسامة وهكذا يحتوي العصير على مواد ( كالكسكريات والأحماض العضوية والأملاح المعدنية والغازات والصبغات والقلويدات والدهون والتانينات وأحيانا البلورات ) وعادة يكون الـ pH للعصير الخلوي حامضيا الا انه في بعض الاحيان قد يصل الى 11 PH حسب مكوناته .

### 2. مواد ايضية أخرى :

تنتج هذه المواد عن الفعاليات الخلوية وتكون أما على هيئة مواد مخزونة أو فضلات . المواد الايضية المعروفة الكربوهيدرات ، مواد بروتينية ، ليبيدات وبعض الأملاح على هيئة بلورات ، حليب نباتي وقلويدات. إن المواد الايضية تؤلف الجزء الغير حي من البروتوبلاست لكن وجودها ضروري فسيولوجيا .

### الانسجة النباتية

تتجمع العديد من الخلايا لتكوين ما يعرف بالنسيج النباتي الذي يعرف بانه مجموعة من الخلايا التي لها نفس الاصل وتشارك في وظيفة اساسية معينة , ولا يمكن لهذه الانسجة ان تعيش مستقلة , بل تعتمد في حياتها على باقي الانسجة , اذ تتجمع مجموعة من الانسجة لتكون ما يعرف بالأعضاء التي تكون بدوها الاجهزة ومن ثم يتكون جسم النبات . وعليه يعرف النسيج بانه عبارة عن مجموعة من الخلايا المقترنة تركيبيا ومكيفة لأداء وظيفة او وظائف معينة. وهي على نوعين :-

أ. الانسجة المرستيمية Meristematic Tissues

ب. الانسجة المستديمة Permanent Tissues

## Classification of plant tissues تصنيف الانسجة النباتية

تصنف الانسجة النباتية اعتماداً على عوامل عديدة اهمها :

اولاً: تصنيف الانسجة اعتماداً على درجة تعقيدها :- تصنف الانسجة اعتماداً على درجة تعقيدها الى انواع هي :

1.الانسجة البسيطة **Simple tissues** :- يتركب النسيج من نوع واحد من الخلايا كما في :

•النسيج الحشوي البارنكيمي parenchyma tissue

•النسيج الكولنكيمي Collenchyma tissue


•النسيج السكرنكيمي Sclerenchyma tissue

•النسيج الفليني Cork tissue

2. الانسجة المعقدة **Complex tissues** :- وفيها يدخل في تركيب النسيج نوعين او اكثر من انواع الخلايا كما في :

•نسيج الخشب **Xylem tissue** :- الذي يتكون من اوعية خشبية Xylem vessels وقصيبيات Tracheids


وبارنكيميا الخشب Xylem parenchyma واللياف خشب Xylem fibers.



نسيج الخشب

•نسيج اللحاء **Phloem tissue** :- الذي يتكون من انابيب غربالية Sieve tube وخلايا مرافقة Companion

cells وبارنكيميا اللحاء Phloem parenchyma واللياف لحاء Phloem fibers.




نسيج اللحاء

**3. الانظمة النسيجية Tissue Systems** :- يشترك في تركيبها انواع مختلفة من الانسجة المعقدة والخلايا الدائمة لتكون وحدات نسيجية كبرى تجمعها وظيفة عامة مشتركة , كما في النظام النسيجي الوعائي الذي يشترك فيه كل من نسيج الخشب واللحاء. والنظام النسيجي الضام , والنظام النسيجي الاساس ,

وتتصف الخلايا المشكلة لأي نسيج نباتي بالميزات التالية :

- (1) تمتلك بنية مورفولوجية متشابهة .
- (2) تقوم بوظائف فسيولوجية واحدة .



نظام نسيجي وعائي

ثانياً: تصنيف الانسجة النباتية اعتماداً على النشاط والانقسام

### 1. الانسجة المرستيمية meristematic tissues :- هي اذ

ولهذا فهي توجد في مناطق النمو بالنبات, وتتميز خلايا الانسجة المرستيمية بالصفات التالية :

1. خلايا قابلة للانقسام .
2. خلايا صغيرة الحجم رقيقة الجدران .
3. المحتويات الحية كثيفة والفجوات قليلة وصغيرة منتشرة في السايوتوبلازم .
4. البلاستيدات بحالة بدائية proplastids وعناصر الشبكة الاندوبلازمية قليلة .
5. خلايا مترابطة لا توجد فيها مسافات بينية وان وجدت فتكون غاية في الضيق .
6. تكون الخلايا مربعة او مضلعة او مستديرة .
7. المحتويات الايضية من نشا وبلورات تكون معدومة او قليلة جدا .

عند انقسام الخلايا المرستيمية تعطي نوعان من الخلايا : الاولى تسمى الخلايا المولدة او الانشائية Initial Cells التي تبقى بحالة مرستيمية بشكل دائم , والثانية : سميت بالخلايا المشتقة Derivative Cells وهي خلايا تتحول

الى خلايا بالغة او ناضجة Mature Cells مصحوبة بعملتي التمييز (differentiation) والتي هي : مجموعة من التغيرات التركيبية والوظيفية التي تعاني منها الخلايا أو النسيج خلال مرحلة التحول من الحالة اليافعة إلى الحالة البالغة. والتخصص specialization وهو : التغير الذي يحصل في الخلية أو النسيج يؤدي إلى تحديد الوظيفة أو القدرة على التكيف للظروف المختلفة وقد يؤدي إلى زيادة الكفاءة للخلايا. وتستطيع الخلايا المتميزة جزئياً أو البالغة وتحت ظروف معينة ان تستعيد حالتها المرستيمية بعملية فقدان التمايز Dedifferentiation كحالة نشوء الكامبيوم الوعائي بين الحزم والكامبيوم الفليني والمرستيم الموجود في البراعم العرضية .

### تصنيف الانسجة المرستيمية -Classification of meristems-

يمكن تقسيم الانسجة المرستيمية على اساس عديدة منها:

أ . على اساس موضعها في جسم النبات:- تقسم الانسجة المرستيمية في هذه الحالة الى الاقسام التالية:

1. **المرستيمات القمية Apical meristems** :- وهي مرستيمات ابتدائية توجد في قمم السيقان والجذور وحيثما الاوراق ويطلق عليها القمم النامية Growing points تنقسم خلاياها بمستويات مختلفة وتشمل عدد قليل من الخلايا الانشائية في النباتات الواطنة اما في النباتات الراقية فتشمل عدد كبير من الخلايا الانشائية قد ينتظم في صف او اكثر ويؤدي نشاط هذه المرستيمات الى الزيادة الطولية في العضو النباتي

2. **المرستيمات الجانبية Lateral meristems** :- وهي مرستيمات توجد في مواقع جانبية في محور العضو الذي توجد فيه وهي مرستيمات ثانوية مثال ذلك الكامبيوم الوعائي Vascular cambium والكامبيوم الفليني Cork cambium or Phellogen . تنقسم خلاياها بمستويات موازية للسطح القريب منها وينشأ عن نشاطها الزيادة القطرية والزيادة في سمك العضو النباتي .

3. **المرستيمات البينية Intercalary meristems** :- عبارة عن مرستيمات ابتدائية وتوجد بين انسجة بالغة مستديمة بعيداً عن القمة النامية كتلك التي توجد في قواعد الاوراق او فوق العقد في سيقان نباتات ذوات الفلقة الواحدة او قواعد السلاميات كما في نباتات الحشائش ويعتبر عمل هذه المرستيمات متمم لعمل المرستيمات القمية حيث انها تساهم في اعطاء الطول النهائي للسلاميات وكذلك تعطي الحجم والشكل النهائي لكثير من التراكيب النباتية كالاوراق والازهار والثمار.

