



الكلية : التربية للعلوم الصرفة

القسم او الفرع : علوم الحياة

المرحلة: الرابعة

أستاذ المادة : م.م. محمد حمادة مصلح

اسم المادة باللغة العربية : طفيليات

اسم المادة باللغة الإنكليزية : Parasitology

اسم المختبر الخامس باللغة العربية: شعبة البوائغ ذوات القمة المركبة

اسم المختبر الخامس باللغة الإنكليزية : Phylum Apicomplexa

مختبر الطفيليات 5

شعبة البوائغ ذوات القمة المركبة Phylum Apicomplexa

يضم هذا الصنف مجموعة كبيرة من الحيوانات الابتدائية تتميز بالصفات الآتية:
1- تعيش متطفلة جميعاً ودون استثناء.

2- لا تمتلك أية عضيات للحركة في أغلب مراحل تطورها، لكن القليل منها في بعض مراحل حياته قد يملك أقداماً كاذبة أو أسواطاً أو أهداباً أو لبيفات عضلية. دورة حياتها معقدة.

3- تشمل حصول تعاقب الأجيال Alternation of generations جيل جنسي وآخر لا جنسي وكذلك تكوين مراحل مقاومة (أبواغ Spores). ويحصل التكاثر اللاجنسي بالانشطار البسيط أو المتعدد أو بالتبرعم الداخلي، أما التكاثر الجنسي فيحصل باتجاه أمشاج Gametes مشابهة أو مختلفة.

من أهم الرتب العائدة للبوغيات الحيوانية ذات العلاقة بحياة الإنسان هي رتبة بوغيات الدم الثانوية Haemosporina ولا سيما عائلة Plasmodiidae التي تصيب العظايا والطيور وبعض اللبائن. وهذه العائلة تضم الجنس Plasmodium الذي يسبب للإنسان مرض الملاريا.

الجنس Plasmodium

شعبة البوائغ ذوات القمة المركبة Phylum Apicomplexa

رتبة البوغيات الدموية الثانوية Suborder Haemosporina

Family Plasmodiidae

Plasmodium vivax

Plasmodium ovale

Plasmodium malariae

Plasmodium falciparum

أفراد هذا الجنس كثيرة الأهمية للإنسان لأنها تسبب مرض الملاريا يعرف هذا المرض أيضاً بأسماء أخرى كالبرداء، الحمى المتقطعة، والرعشة والحمى، حمى الساحل، حمى أو مرض المستنقع. وكلمة الملاريا تعني بالإيطالية الهواء الرديء أو الفاسد، وسبب التسمية هذه يعود لاقتران المرض بالهواء ذي الروائح الكريهة عند المستنقعات ولا سيما بالليل. هناك أربعة أنواع من الجنس Plasmodium تسبب مرض الملاريا للإنسان:

1- Plasmodium vivax تسبب ملاريا الثلث Tertian Malaria

2- Plasmodium ovale تسبب ملاريا الثلث البيضوية .Ovale Tertian Malaria

3- Plasmodium malariae تسبب ملاريا الربع Quartan Malaria

4- Plasmodium falciparum تسبب الملاريا المنجلية Falciparum Malaria وتسمى أيضا

ملاريا دون الثلث Subterian Malaria وهي أخطر الأنواع وأشدّها ضراوة.

دورة الحياة: تحدث العدوى للإنسان عندما تلسه أنثى بعوضة الأنوفيليس Anopheles المصابة حيث يتم حقن المئات من البويضات المعدية Sporozoite مع اللعاب الملوث للبعوضة. تشمل دورة حياة الملاريا مرحلتين، مرحلة لاجنسية في الإنسان ومرحلة جنسية في داخل التجويف البطني للبعوضة:

الدورة اللاجنسية (الانفلاقية) في جسم الإنسان Schizogony

بعد وصول البويضات المحقونة من قبل أنثى بعوضة الأنوفيليس إلى تيار الدم تنتقل معه إلى خلايا الكبد حيث تستقر فيها وتنمو إلى طور مستدير ثم تنقسم النواة إلى عدد كبير من الأنوية مكونة المنقسمة Schizont ثم تحاط كل نواة بجزء من الساييتوبلازم مكونة المئات من الأقسومات Cryptozoites بعدها تنفجر خلية الكبد وتحرر الأقسومات وتصيب خلايا كبدية جديدة نواتج الجيل الثاني (في حالة حصوله) فتسمى Metacryptozoites أو Merozoites التي يتراوح عددها بين 10-40 ألف في كل خلية كبدية. وبعد حوالي عشرة أيام تهاجم أغلب الأقسومات الناتجة الكريات الدموية الحمراء لتبدأ دورات مستمرة داخل كريات الدم الحمر تسمى Erythrocytic cycle.

مراحل دورة حياة الطفيلي داخل كريات الدم الحمر Erythrocytic cycle

1- الطور حلقي Ring stage: حيث بعد أن يدخل الميروزويت كرية الدم الحمراء يظهر بشكل طور

حلقي وذلك بسبب ظهور مساحة (فجوة) في وسط الطفيلي محاطة بحلقة من الساييتوبلازم مع نواة دقيقة في إحدى الجهات، يشغل الطور الحلقي حوالي ثلث حجم الكرية الحمراء.

2- الطور الخضري Trophozoite: يستمر نمو الطفيلي يصبح مدوراً أو غير منتظم الشكل ويأخذ

شكلاً أميبياً غير منتظم. غالباً به حبيبات ناتجة من هضم هموكلوبين الكرية الدموية الحمراء التي يعيش بداخلها.

3- المنقسمة Schizont: يستمر الطفيلي بالنمو داخل الكرية الحمراء، تنقسم النواة عدة انقسامات تنتج

عدداً من الأنوية ثم يحيط بكل نواة جزء من الساييتوبلازم ثم تنفصل هذه الأجزاء مكونة عدداً من الأقسومات Merozoites تتكون 12-24 ميروزويتات تسمى Erythrocytic merozoites تترك الكرية بعد تحطمها.

4- الخلايا المكونة للأمشاج Gametocytes: بعد بضعة أجيال من الشايزونت فان قسماً من

الميروزويتات تبدأ بالنمو بصور أبطأ وتكون أصبغاً أكثر وتنمو منتجة ما يسمى الخلايا المكونة للأمشاج Gametocytes بنوعها الصغيرة (ذكرية) والكبيرة (أنثوية) والتي تستمر بالدوران بالدم لعدة أسابيع وهي لا تعاني من نمو داخل جسم الإنسان.

أولاً: Plasmodium vivax

تسبب ملاريا الثلث **Tertian Malaria** حيث تتستعرض الدورة داخل كرية الدم الحمراء 48 ساعة وتظهر الأعراض في اليوم الثالث.
الطور حلقي Ring stage: يكون الطفيلي بشكل حلقة تكون حوالي ثلث حجم كرية الدم الحمراء.
الطور الخضري Trophozoite يلاحظ في هذا الطور:
A. تضخم كرية الدم الحمراء المصابة مقارنة مع بقية كريات الدم الحمراء.
B. تظهر حبيبات دقيقة تصطبغ باللون الأحمر تسمى حبيبات شوفنر Schuffner's dots
المنقسمة Schizont: يتراوح عدد الأقسومات Merozoites تتكون 12-24 (معدل 16) في كل كرية دم حمراء مصابة.

ثانياً: Plasmodium ovale

تسبب ملاريا الثلث البيضوية **Ovale Tertian Malaria** حيث تتستعرض الدورة داخل كرية الدم الحمراء 48 ساعة وتظهر الأعراض في اليوم الثالث.
الطور حلقي Ring stage: يلاحظ في هذا الطور:
A. تضخم كرية الدم الحمراء المصابة مقارنة مع بقية كريات الدم الحمراء.
B. تصبح كريات الدم الحمراء المصابة بيضوية بدلاً من شكلها المعتاد وتكون نهايتها غير منتظمة (مشرشرة).
C. تظهر حبيبات دقيقة تسمى حبيبات شوفنر Schuffner's dots.
المنقسمة Schizont: يتراوح عدد الأقسومات Merozoites تتكون 12-24 في كل كرية دم حمراء مصابة.

ثالثاً: Plasmodium malariae


تسبب ملاريا الربع **Quartan Malaria** حيث تتستعرض الدورة داخل كرية الدم الحمراء 72 ساعة وتظهر الأعراض في اليوم الرابع.
الطور الخضري Trophozoite يلاحظ في هذا الطور:
A. يكون الطفيلي بشكل شريط أو خيط يقع على طول قطر كريات الدم الحمراء المصابة.
B. تظهر حبيبات دقيقة تسمى حبيبات زايمن Ziemann's dots.
المنقسمة Schizont: يتراوح عدد الأقسومات Merozoites تتكون 6-8 في كل كرية دم حمراء مصابة.

رابعاً: Plasmodium falciparum



تسبب الملاريا المنجلية **Falciparum Malaria** وتسمى أيضاً ملاريا دون الثلث **Subtertian Malaria** حيث تتستعرض الدورة داخل كرية الدم الحمراء لفترة غير منتظمة بين 36-48 ساعة وتظهر الأعراض بصورة متقاربة غير منتظمة. وهي أخطر الأنواع وأشدّها ضراوة.
الطور حلقي Ring stage:
يكون الطفيلي صغيراً جداً ويشكل حوالي خمس حجم كرية الدم الحمراء.
غالباً يلاحظ وجود أكثر من حلقة واحدة داخل كرية الدم الحمراء الواحدة أو تظهر حلقة واحدة ذات نواتين.
تصبح كريات الدم الحمراء المصابة بالنوع **P. falciparum** أكثر لزوجة بعد مرحلة الطور الحلقي، فتتجمع في الأعضاء الداخلية ولا تظهر في الدوران المحيطي.

الطور الخضري Trophozoite




يلاحظ في هذا الطور تظهر حبيبات أو نقاط مورر Maurer's dots or spots .
المنقسمة Schizont: يتراوح عدد الأقسومات Merozoites تتكون 6-8 في كل كرية دم حمراء مصابة.



Ring stage



Trophozoite الطور الخضري



Schizont: المنقسمة

