الإسبهال الدموي (داء الكريات) الكوكسيديا Coccidiosis :

من الامراض التي تسببها طفيليات وحيدة الخلية (الاوليات) وتوجدتسعة اصناف من جنس الكوكسيدياالاميريا Eimeria وهذا التصنيف حسب الموقع الذي يصيب به من الامعاء:

- 1. آميريااسرفولينا E.Acervulina تصيب منطقة الاثني عشري .
 - 2. آميرياميفاتي E.mivati تصيب الاثني عشري .
 - 3. هاغاني E.Hagani تصيب الاثني عشري
 - 4. آميريامايتس E.mitis تصيب الاثنى عشري .
 - 5. آميربابريكوكس E.pracox تصيب الاثنى عشري .
- 6. آميريانيكاتكس E.Necatric تصيب منطقة انصال الصائم باللفائفي ولا تصيب الانثى عشرى .
 - 7. آميرباماكسما E.maxima نفس منطقة الاصابة .
- 8. آميريا برونيتي E.brunetti يصيب مؤخرة الامعاء المنطقة المحصورة بين العورين وهذا الصنف شديد الضراوة ولكنه مرض شائع .
- 9. آميرياتنالا E.tenella شديد الضراوة ومنتشر في العراق وهذا الصنف يصيب الاعورين .

ومن العلامات السريرية للاصابةبالاميرياتئلا الخمول وعدم الرغبة في الحركة مع أثار الاسهال الدموي في منطقة المجمع اما التغيرات المرضية او الصفة التشريحية وجود بؤر بيض ورصاصية اللون في جدار وبطانة الاعورين مع بقع نزفية صغيرة هذا في الاصابات الخفيفة اما في الحالات الشديدة يلاحظ امتلاء الاعورين بالدم السائل او المتخثر وجدار الاعورين بني محمر قريب الى اللون الاسود , ويمكن الوقاية من المرض من خلال تلقيح الافراخ بعمر عشرة ايام بلقاح الكوكسديا التي يحتوي على اكياس بيض مضعفة اما العلاج فيتم من خلال اضافة الامبرول او المونسين monenesin مع ملاحظة عدم اضافة الادوية التي تحتوي السلفا الى الدجاج البياض او الامهات .

الديدان الشريطية Tap worms:

هي من الطفيليات المعروفة في الانسان والحيوان والديدان الشريطية التي تصيب الدجاج من مجموعة ديدان غينيا وتمتاز باحتواء راسها على اربعة محاجم ومن اهم اجناس الديدان الشريطية:

- 1. جنس اميبوتينسAmoebotenis التي تعيش في الانثى عشري .
- 2. جنس جاتونوتينيا Choatanotaenia تعيش في الجزء الوسطي للامعاء الدقيقة .
- 3. جنس دافانيا Davainea وهي من اخطر انواع الديدان الشريطية وهي تصيب الامعاء .
- 4. جنس ريليتينا Reillietina وهذا الجنس الاكثر انتشارا في الدواجن وتعيش في الاثنى عشرى ووسط الامعاء .
 - 5. جنس ابورينا Aporina وهذا الجنس يصيب الحمام .
- 6. جنس هايمينوليبس Hymenolepis ويشمل انواع عديدة منها يصيب الدجاج والاخر يصيب البط.

الوقاية : من خلال القضاء على الوسيط التي هي الحشرات والحلزون .

العلاج :الترانايدول Trithiadol (1.5) كغم / طن علف لمدة خمسة ايام .

بيوتينورينButynorate (0.07) % من العلف لمدة خمسة ايام .

اليوميزان Yomezon (50) ملغم /طن .

الاعراض : تسبب الاصابة بالديدان الشريطية ضعف شديد وقلة انتاج البيض ويمكن التاكد من الاصابة من خلال فحص مخلفات الدجاج.

الطفيليات الخارجية Ectoparasites

القمل Lice

وهو من اكثر الطفيليات الخارجية انتشارا في الدواجن وخاصة في المناطق الحاره مثل العراق فان ظهور حشرة واحدة على الدجاج يعني ان كل القطيع مصاب ويصيب الدجاج البياض والامهات اكثر من الفروخ واهم انواع القمل:

1. قمل الريش Shaft Lice . 1

- . Fluff Lice قمل الزغب. 2
- 3. Head Lice قمل الراس.
 - Boday Lice قمل الجسم.4
- . Wing Lice قمل الجناح.5
- 6. قمل الدجاج الكبير Large chicken Lice
- . Brown chicken Lice قمل الدجاج البني.7

اعراض الاصابة: تهيج الطائر مما يؤثر على استهلاكه للعلف وقلة انتاج البيض ونقر الجلد مما يؤدي الى حصول حالات الافتراس الوقاية: مسحوق سيفين او التجوفون (1.5) غم /لتر بمعدل (1)لتر لكل (30) م يرش كل ثلاثة اشهر مره.

العلاج:

- التعفير Dusting بمسحوق الكارياميت (1%) او سيفين مع بودرة التالك مع تحريك الريش يعكس الاتجاه ليصل المسحوق الى مكان وجود الطفيلى .
- التغطيس Dipping بمحلول فلوريد الصوديوم (1%) او بمحلول التيجوفون (1%) . (0.15%) .
- التشحيم Greasing باستعمال مرهم الزئبق (30%) والفازلين بمعدل (1:1) ويستعمل خاصة لمنطقة الراس .
- التبخير Fumigation بسلفات النيكوتين (40%) في حالة وجود المجاثم تدهن في النهار قبل الظلام بوقت قليل فيتم تبخر المادة وتتخلل داخل الريش وتقضي على الطفيلي تعاد هذه العملية بعد (7-10) يوم .

القراد Tick

Argaspersicus

يصيب الدجاج ويوجد بشكل تجمعات في المناطق العارية من الجلد يسبب القراد خسائر بالدجاج وذلك لقيام الطفيلي بامتصاص دم المضيف ويسبب انتقال الامراض له كما ذكر سابقاً.

الوقاية: رش المبيدات الحشرية في جميع مرافق حقول التربية وخاصة في الشقوق والمجاثم والمبايض ومن المبيدات الحشرية الملاثيون (3%) وروبان (1%) وكاربايل (2%).

العلاج: استعمال مبيدات الحشرات وتخفيفه بالباودر وبكمية متساوية (1:1) ورش المسحوق بصورة خفيفة في المنطقة المصابة